



**Daxopil<sup>®</sup> 60** Film-Coated Tablets  
Dapoxetine



PARS DAROU

<http://Daxopil.com>

صدای مشتری: ۷۴۳۷۳

**My choice is correct,  
but I want it more potent !**



ما تنها درمان استاندارد  
انزال زودرس را فراهم آورده ایم.



داکسوپیل® ۶۰

دایوکستین (قرص روکش دار ۶۰ میلی گرمی)

### ● اختلال انزال زودرس

انزال زودرس، شایعترین اختلال جنسی در مردان است که حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد آنها در طول زندگی آن را تجربه می نمایند.

شایعترین علائم و نشانه های تشخیص داده شده این اختلال عبارتند از:

- انزال - همیشه یا تقریباً همیشه - با کمترین تحریک جنسی
- انزال زودتر از زمان مطلوب
- احساسات شخصی منفی همانند اضطراب، پریشانی و ناامیدی

### ● درمان

**داکسوپیل®** اولین داروی خوراکی است که به صورت اختصاصی برای درمان اختلال انزال زودرس در دسترس آقایان قرار داده شده است. **داکسوپیل®** حاوی دایوکستین است که اثر دارویی آن افزایش سطح سروتونین در بدن است. سروتونین قادر به افزایش زمان تحریک تا انزال است و این اثر را با کاهش سرعت طی مسیری که در بدن منتهی و مرتبط به انزال زودرس است ایجاد می نماید.

### ● داکسوپیل® در یک نگاه

- **داکسوپیل®** برای درمان اختلال انزال زودرس در آقایان ۱۸ تا ۶۴ ساله تجویز می گردد.
- **داکسوپیل®** باید یک الی سه ساعت پیش از فعالیت جنسی و مطابق با دستور پزشک معالج مصرف شود. مصرف بیش از یک بار آن در هر شبانه روز (هر ۲۴ ساعت) توصیه نمی شود. قرص باید همراه با یک لیوان پر از آب و به صورت کامل بلعیده شود. این دارو می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود.
- از مصرف بیش از میزان تجویز شده این دارو باید اجتناب شود.
- **داکسوپیل®** می تواند حس کنترل فرد بر زمان بروز انزال را افزایش دهد.
- **داکسوپیل®** دارای اثربخشی سریع می باشد و متعاقب آن به سرعت از بدن حذف می شود.
- **داکسوپیل®** موجب افزایش رضایتمندی آقایان از انجام فعالیت جنسی و مقاربت و همچنین موجب تخفیف اضطراب و پریشانی مرتبط با بروز اختلال انزال زودرس در آنها می گردد.
- **داکسوپیل®** دارای عوارض جانبی معمولاً خفیفی است که عبارتند از: سرگیجه، سردرد و احساس ناخوشی

### ● نکات قابل توجه حین مصرف داکسوپیل®

- از مصرف الکل در زمان مصرف **داکسوپیل®** باید پرهیز شود؛ زیرا مصرف همزمان این دو موجب افزایش احتمال بروز عوارض ناخواسته ای مانند احساس ضعف و غش خواهد شد.
- در صورت احساس سرگیجه یا سردرد متعاقب مصرف **داکسوپیل®** باید از رانندگی و یا کار با ماشین آلات خطرناک اجتناب نمود.
- مصرف همزمان سایر داروها با **داکسوپیل®** باید تحت نظر پزشک صورت پذیرد تا از بروز عوارض غیر قابل پیش بینی و در برخی موارد آسیب زننده جلوگیری شود.



PARS DAROU  
Tehran - IRAN

آدرس: فلکه اول تهرانپارس. بلوار پروین. شرکت پارس دارو

صدای مشتری: ۷۴۳۷۳

تلفن: ۷۰-۷۷۷۰۴۰۶۱