

EMPATUS-PLUS®

+ Empagliflozin 5 or 12.5 mg
Metformin HCL 500 or 1000 mg

امپاتوس - پلاس®

امپاگلیفلووزین ۵ یا ۱۲/۵ میلی گرم + متفورمین هیدروکلراید ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ میلی گرم

۲ داروی تایید شده برای درمان دیابت در یک قرص

امپاتوس - پلاس® ترکیبی از دو داروی امپاگلیفلووزین و متفورمین، تایید شده برای درمان دیابت نوع ۲ است. امپاتوس - پلاس® به همراه ورزش و رژیم غذایی مناسب به منظور اصلاح سطح قند خون در بیماران بالغ مبتلا به دیابت نوع ۲ (بخصوص کسانی که علاوه بر دیابت نوع ۲ به بیماری‌های قلبی - عروقی نیز مبتلا می‌باشند) و امپاگلیفلووزین در ایشان به عنوان عامل کاهنده خطر بروز مرگ‌های ناشی از اختلالات قلبی - عروقی مورد نیاز است) تجویز می‌گردد. این ترکیب می‌تواند در موارد ذیل موثر واقع شود:

۱- کاهش هموگلوبین A1C

نتایج حاصل از انجام مطالعات بالینی در بیماران بالغ مبتلا به دیابت نوع ۲ حاکی از آن است که مصرف ترکیب امپاگلیفلووزین و متفورمین (همراه با ورزش و رعایت رژیم غذایی مناسب) در این افراد سطح هموگلوبین A1C را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، درمان با این ترکیب در مقایسه با درمان با متفورمین به تنها، کاهش بیشتری را در سطح هموگلوبین A1C ایجاد می‌نماید.

۲- کاهش میزان قند خون

بر اساس نتایج تایید شده مطالعات بالینی، مصرف ترکیب امپاگلیفلوژین و متفورمین به کاهش سطح قند خون ناشتا کمک شایانی می‌نماید.

۳- کمک به کنترل وزن بدن و فشار خون

اگرچه کاهش وزن بدن و فشار خون به عنوان موارد تجویز امپاتوس-پلاس[®] مطرح نشده است، اما این ترکیب می‌تواند در هر دو مورد کمک کننده باشد. در مطالعات بالینی انجام شده در بیماران بالغ مبتلا به دیابت نوع ۲ نشان داده است که مصرف ترکیب امپاگلیفلوژین و متفورمین به طور متوسط موجب کاهش ۲ الی ۳ درصد وزن بدن در ایشان گردیده است. همچنین تجویز ترکیب امپاگلیفلوژین و متفورمین در برخی بیماران، فشار خون سیستولیک را تحدید کاهش داده است.

صرف در بارداری و شیردهی:

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

مقدار مصرف دارو:

دوز در افراد بالغ (۱۸ تا ۸۴ سال) : مصرف یک عدد قرص امپاتوس - پلاس[®] (هر کدام از دوزها طبق صلاحیت پزشک معالج) دو بار در روز

We
Defeat
DIABETES



ساخت شرکت پارس دارو
اصفهان، ایران
تهران، ایران

www.parsdarou.ir | ۰۲۱-۷۷۴۳۷۳۰۰
اصفهان، ایران