کاربامازپین ۲۰۰ میلی گرم

قرص خط دار

مطالب لازم برای بیمار :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. دارو را مطابق تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقدار تجویز شده تجاوز ننمایید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصـرف دارو به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است از مصرف آن یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی برابر مصرف نمایید.
- کاربامازپین یک داروی ضد درد ساده نیست لذا از آن به عنوان یک داروی ضد درد عمومی استفاده نکنید.
- بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.
- ضمن درمان از خوردن گریپ فروت یا عصاره آن خودداری کنید.
- جهت جلوگیری از بارداری از روش های دیگری غیر از خوردن داروهای ضد بارداری حاوی استروژن، استفاده نمایید.
- در صورتیکه نیاز به تست های آزمایشگاهی داشتید مسئولین مربوطه را از مصرف این دارو مطلع نمایید، مصرف این دارو ممکن است باعث تداخل در پاسخ بـرخی از تست هـا شود مثل تست بـارداری، غلظت آنزیـم هـای کبـدی، آزمون های عملکرد تیروئید، مقدار BUN، شمارش هموگلوبین و هماتوکریت ،گرانولوسیت ها، گلبول سفید و پلاکت ها.
- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی، خواب آلودگی، سرگیجه، تاری دید و دوبینی شود لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند اجتناب کنید.
- مصرف این دارو باعث حساسیت پوست به نور می شود لذا ضمن درمان از قرار گرفتن در مقابل تابش مستقیم خورشید یا لامپ های مهتابی به شدت اجتناب نمایید.

در صورت بروز هر یک از علائم زیر باید بلافاصله با پزشک یا مرکز درمانی تماس گرفته شود :

تب، گلودرد ، زخم پوستی (راش)، زخم دهان، عفونت، کبودی، لنفادنوپاتی، لکه های خونی زیر پوست (خون مردگی)، ناتوانی جنسی (درمردان)، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و زردی.

مصرف این دارو در صورت داشتن علائم (بیماری های) زیر ممنوع می باشد :

- صرع غایب، آتونیک یا میوکلونیک، بلوک قلبی دهلیزی ـ بطنی، اختلالات خونی، سابقه کاهش فعالیت مغز استخوان
- حساسیت مفرط به کاربامازپین
- حساسیت مفرط به داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مثل آمی تریپتیلین، دزی پرامین، ایـمی پرامین،نورتریپتیلین، پروتریپتیلین

در موارد ذیل منافع و مضار مصرف این دارو باید سنجیده شوند :

بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم)، مشکلات خونی، بیماریهای کبدی و کلیوی، احتباس ادراری، اختلالات رفتاری، الکلیسم و مصرف در سالمندان

در صورت بروز هر یک از علائم ذیل مصرف دارو باید قطع گردد :

- حساسیت مفرط، افزایش بارز نتایج آزمون های عملکرد کبدی، اختلالات خونی، بروز علائم کاهش فعالیت مغز استخوان (تب، گلودرد، زخم دهان، کبود شدن بی دلیل پوست، پتشی یا پورپورای همراه با خونریزی)

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

قبل از مصرف این دارو در موارد ذیل با پزشک خود مشورت نمایید :

- وجود هرگونه حساسیت نسبت به کاربامازپین یا داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای
- مصرف در سالمندان
- بارداری و شیردهی
- لزوم انجام ترمیم های دندانی و جراحی
- داشتن دیابت (مصرف این دارو در بیماران دیابتی باعث افزایش غلظت قندخون می شود)
- از آنجایی که با مصرف این دارو در برخی موارد ایجاد آنمی آپلاستیک و آگرانولوسیتوز گزارش شده است لذا لازم است قبل از تجویز این دارو تمام موارد مربوط به فاکتورهای خونی سنجیده و مورد درمان قرار گیرند.
- پس از مصرف دارو در صورت بروز هریک از علائم مربوط به کاهش فعـالیت مـغـز استخوان، مصرف دارو باید تحت نظر پزشک قطع گردد.
- از آنجایی که کاربامازپین اثرات آنتی کولینرژیکی خفیفی از خود نشان می دهد، لذا احتمال افزایش فشارداخل چشمی حین درمان و معاینات باید مدنظر قرار گیرد.

- مصرف کاربامازپین در موارد صرع غایب باید با احتیاط صورت گیرد چرا که مصرف این دارو تعداد دفعات تشنج را افزایش می دهد.
- مصرف این دارو باید در بیماران دچار بیماری قلبی شامل بلوک دهلیزی ـ بطنی درجه ۲ با احتیاط صورت گیرد.
- با مصرف این دارو واکنش های درماتولوژیک شدید (شامل نکروز سمی اپیدرم و سندروم استیونس ـ جانسون) گزارش شده است.
- مصرف همزمان کاربامازپین با مهارکننده های مـونـوآمـین اکسیداز توصیه نمی شود. در صورت مصرف این داروهـا باید مصرف آنها قطع شده و پس از حداقل ۱۴ روز از قطع مصرف، کاربامازپین تجویز گردد.
- استفاده همزمان این دارو با داروهای دیگر از جمله :

داروهای ضد انعقاد خون، ضد احتقان ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، استامینوفن، آمینوفیلین، تئوفیلین، باربیتورات هـا، بنزودیازپین هـا (بـه خصوص کلـونـازپـام)، سایمتیدین، کلاریترومـایسین،کلومیپرامین، ریفامپین، سیس پلاتین، دوکسوروبیسین، داروهای سیستم اعصاب مرکزی، داروهای ضد بارداری خوراکی استروژن دار، کورتیکواستروییدها، فلووکسامین، ایتراکونازول، کتوکونازول، لاموتریژین، مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز، پروپوکسیفن، کینیدین، ریسپریدون، وراپامیل، والپروئیک اسید، داروهای ضد مالاریا، دانازول، ترفنادین، لوراتادین، داکسی سایکلین، اریتـرومایسین، فولیک اسید، فلوکستین، ایزونیـازید، ایزوترتینوئین، واکسن آنفلوآنـزا، لیتیم، مبندازول، متوکلوپرامید، پروپوکسی فن، توپیرامات، پرازی کوآنتل، پانکرونیوم، نفازودون و ...

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. هرگز این دارو را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هریک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید :

عوارضی که در صورت وقوع نیاز به مراقبت پزشکی دارند :

عوارض با شیوع بیشتر :

اختلال در سیستم اعصاب مرکزی (تاری دید، دوبینی، سرگیجه)

عوارض با شیوع کمتر :

واکنش های حساسیتی، سندرم استیونس ـ جانسون، نکروزسمـی اپیدرم (راش پوستی، خارش و...)، واکنش هـای عصبی، آتاکسی(راه رفتن لرزان و ناپایدار و مشکلات مربوط به کنترل عضلات)، تغییرات رفتاری (خصوصاً در کودکان)، درد قفسه سینه، اختلالات شخصیتی، مشکلات خواب، اسهال، اختلال در صحبت کردن، هایپوناترمی و مسمومیت با آب (SIADH)، عفونت، واکنش هـای مانیک دپرسیو، تمایل بـه خودکشی یا دیگرکشی، سندروم شبیه لوپوس اریتماتوزسیستمیک، آدنوپاتی، آنمی آپلاستیک، مشکلات خونی، مشکلات قلبی و عروقی و ...

عوارضی که فقط در صورت ادامه یافتن یا آزار بیمار نیاز به مراقبت های پزشکی دارند :

سرگیجه، گیجی، خواب آلودگی، تهوع و استفراغ، یبوست، بی اشتهایی، مشکلات جنسی در مردان، بی خوابی، اختلال در تکلم، خستگی و ...

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه :

- در صورت مصرف اتفـاقی دوزهـای بیش از حد دارو، فوراً با پزشک تماس حاصل فرمایید و یا بیمار را بـه یک واحد درمانی برسانید.
- علائم مصرف بیش از حد این دارو شامل کم ادراری یا کاهش ناگهـانی حجم ادرار، مشکلات قلبی و عروقی، کاهش هوشیاری، صرع در کودکان، گیجی و خواب آلودگی شدید، عدم کنترل حرکات بدن، افزایش یا کاهش فشارخون، استفراغ و تهوع شدید، شوک و لرزش و مشکلات تنفسی می باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می باشد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی:

- ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی.

ساخت ((پارس دارو))
تهران - ایران
صدای مشتری: ۳۷۳ ۷۴-۰۲۱
www.parsdarou.ir

کاربامازپین ۲۰۰ میلی گرم

قرص خط دار

مطالب لازم برای بیمار :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. دارو را مطابق تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقدار تجویز شده تجاوز ننمایید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصـرف دارو به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است از مصرف آن یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی برابر مصرف نمایید.
- کاربامازپین یک داروی ضد درد ساده نیست لذا از آن به عنوان یک داروی ضد درد عمومی استفاده نکنید.
- بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.
- ضمن درمان از خوردن گریپ فروت یا عصاره آن خودداری کنید.
- جهت جلوگیری از بارداری از روش های دیگری غیر از خوردن داروهای ضد بارداری حاوی استروژن، استفاده نمایید.
- در صورتیکه نیاز به تست های آزمایشگاهی داشتید مسئولین مربوطه را از مصرف این دارو مطلع نمایید، مصرف این دارو ممکن است باعث تداخل در پاسخ بـرخی از تست هـا شود مثل تست بـارداری، غلظت آنزیـم هـای کبـدی، آزمون های عملکرد تیروئید، مقدار BUN، شمارش هموگلوبین و هماتوکریت ،گرانولوسیت ها، گلبول سفید و پلاکت ها.
- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی، خواب آلودگی، سرگیجه، تاری دید و دوبینی شود لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند اجتناب کنید.
- مصرف این دارو باعث حساسیت پوست به نور می شود لذا ضمن درمان از قرار گرفتن در مقابل تابش مستقیم خورشید یا لامپ های مهتابی به شدت اجتناب نمایید.

در صورت بروز هر یک از علائم زیر باید بلافاصله با پزشک یا مرکز درمانی تماس گرفته شود :

تب، گلودرد، زخم پوستی (راش)، زخم دهان، عفونت، کبودی، لنفادنوپاتی، لکه های خونی زیر پوست (خون مردگی)، ناتوانی جنسی (درمردان)، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و زردی.

مصرف این دارو در صورت داشتن علائم (بیماری های) زیر ممنوع می باشد :

- صرع غایب، آتونیک یا میوکلونیک، بلوک قلبی دهلیزی ـ بطنی، اختلالات خونی، سابقه کاهش فعالیت مغز استخوان
- حساسیت مفرط به کاربامازپین
- حساسیت مفرط به داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مثل آمی تریپتیلین، دزی پرامین، ایـمی پرامین، نورتریپتیلین، پروتریپتیلین

در موارد ذیل منافع و مضار مصرف این دارو باید سنجیده شوند :

بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم)، مشکلات خونی، بیماریهای کبدی و کلیوی، احتباس ادراری، اختلالات رفتاری، الکلیسم و مصرف در سالمندان

در صورت بروز هر یک از علائم ذیل مصرف دارو باید قطع گردد :

- حساسیت مفرط، افزایش بارز نتایج آزمون های عملکرد کبدی، اختلالات خونی، بروز علائم کاهش فعالیت مغز استخوان (تب، گلودرد، زخم دهان، کبود شدن بی دلیل پوست، پتشی یا پورپورای همراه با خونریزی)

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو :

قبل از مصرف این دارو در موارد ذیل با پزشک خود مشورت نمایید :

- وجود هرگونه حساسیت نسبت به کاربامازپین یا داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای
- مصرف در سالمندان
- بارداری و شیردهی
- لزوم انجام ترمیم های دندانی و جراحی
- داشتن دیابت (مصرف این دارو در بیماران دیابتی باعث افزایش غلظت قندخون می شود)
- از آنجایی که با مصرف این دارو در برخی موارد ایجاد آنمی آپلاستیک و آگرانولوسیتوز گزارش شده است لذا لازم است قبل از تجویز این دارو تمام موارد مربوط به فاکتورهای خونی سنجیده و مورد درمان قرار گیرند.
- پس از مصرف دارو در صورت بروز هریک از علائم مربوط به کاهش فعـالیت مـغـز استخوان، مصرف دارو باید تحت نظر پزشک قطع گردد.
- از آنجایی که کاربامازپین اثرات آنتی کولینرژیکی خفیفی از خود نشان می دهد، لذا احتمال افزایش فشارداخل چشمی حین درمان و معاینات باید مدنظر قرار گیرد.

- مصرف کاربامازپین در موارد صرع غایب باید با احتیاط صورت گیرد چرا که مصرف این دارو تعداد دفعات تشنج را افزایش می دهد.
- مصرف این دارو باید در بیماران دچار بیماری قلبی شامل بلوک دهلیزی ـ بطنی درجه ۲ با احتیاط صورت گیرد.
- با مصرف این دارو واکنش های درماتولوژیک شدید (شامل نکروز سمی اپیدرم و سندروم استیونس ـ جانسون) گزارش شده است.
- مصرف همزمان کاربامازپین با مهارکننده های مـونـوآمـین اکسیداز توصیه نمی شود. در صورت مصرف این داروهـا باید مصرف آنها قطع شده و پس از حداقل ۱۴ روز از قطع مصرف، کاربامازپین تجویز گردد.
- استفاده همزمان این دارو با داروهای دیگر از جمله :

داروهای ضد انعقاد خون، ضد احتقان ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، استامینوفن، آمینوفیلین، تئوفیلین، باربیتورات هـا، بنزودیازپین هـا (بـه خصوص کلـونـازپـام)، سایمتیدین، کلاریترومـایسین، کلومیپرامین، ریفامپین، سیس پلاتین، دوکسوروبیسین، داروهای سیستم اعصاب مرکزی، داروهای ضد بارداری خوراکی استروژن دار، کورتیکواستروییدها، فلووکسامین، ایتراکونازول، کتوکونازول، لاموتریژین، مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز، پروپوکسیفن، کینیدین، ریسپریدون، وراپامیل، والپروئیک اسید، داروهای ضد مالاریا، دانازول، ترفنادین، لوراتادین، داکسی سایکلین، اریتـرومایسین، فولیک اسید، فلوکستین، ایزونیـازید، ایزوترتینوئین، واکسن آنفلوآنـزا، لیتیم، مبندازول، متوکلوپرامید، پروپوکسی فن، توپیرامات، پرازی کوآنتل، پانکرونیوم، نفازودون و ...

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. هرگز این دارو را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.

عوارض جانبی دارو :

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هریک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید :

عوارضی که در صورت وقوع نیاز به مراقبت پزشکی دارند :

عوارض با شیوع بیشتر :

اختلال در سیستم اعصاب مرکزی (تاری دید، دوبینی، سرگیجه)

عوارض با شیوع کمتر :

واکنش های حساسیتی، سندرم استیونس ـ جانسون، نکروزسمـی اپیدرم (راش پوستی، خارش و...)، واکنش هـای عصبی، آتاکسی(راه رفتن لرزان و ناپایدار و مشکلات مربوط به کنترل عضلات)، تغییرات رفتاری (خصوصاً در کودکان)، درد قفسه سینه، اختلالات شخصیتی، مشکلات خواب، اسهال، اختلال در صحبت کردن، هاپیوناترمی و مسمومیت با آب (SIADH)، عفونت، واکنش هـای مانیک دپرسیو، تمایل بـه خودکشی یا دیگرکشی، سندروم شبیه لوپوس اریتماتوزسیستمیک، آدنوپاتی، آنمی آپلاستیک، مشکلات خونی، مشکلات قلبی و عروقی و ...

عوارضی که فقط در صورت ادامه یافتن یا آزار بیمار نیاز به مراقبت های پزشکی دارند :

سرگیجه، گیجی، خواب آلودگی، تهوع و استفراغ، یبوست، بی اشتهایی، مشکلات جنسی در مردان، بی خوابی، اختلال در تکلم، خستگی و ...

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه :

- در صورت مصرف اتفـاقی دوزهـای بیش از حد دارو، فوراً با پزشک تماس حاصل فرمایید و یا بیمار را بـه یک واحد درمانی برسانید.
- علائم مصرف بیش از حد این دارو شامل کم ادراری یا کاهش ناگهـانی حجم ادرار، مشکلات قلبی و عروقی، کاهش هوشیاری، صرع در کودکان، گیجی و خواب آلودگی شدید، عدم کنترل حرکات بدن، افزایش یا کاهش فشارخون، استفراغ و تهوع شدید، شوک و لرزش و مشکلات تنفسی می باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می باشد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی :

- ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی.

ساخت ((پارس دارو))
تهران - ایران
صدای مشتری: ۳۷۳ ۷۴-۰۲۱
www.parsdarou.ir

Pantone 361C