

دزیپرامین

قرص روکش دار ۲۵ میلی گرمی

دسته دارویی:

ضد افسردگی سه حلقه‌ای

موارد مصرف دارو:

افسردگی

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقادیر تجویز شده تجاوز نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه غذا میل نمایید.
- گاهی اوقات برای شروع اثر درمانی لازم است چند هفته این دارو مصرف گردد روند بهبودی بیماری شما با مراجعات مکرر به پزشک خود تحت کنترل خواهد بود.

موارد منع مصرف:

- دارا بودن هر نوع واکنش غیر عادی یا حساسیتی نسبت به این دارو یا سایر داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، کاربامازپین، ماپروتیلین و ترازودون.

مصرف در بارداری و شیردهی:

گروه C، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

احتیاطات:

- این دارو ممکن است سبب خواب‌آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- این دارو ممکن است در هنگام تغییر وضعیت از حالت درازکش به نشسته ایجاد سرگیجه و ضعف جسمانی نماید، برخاستن آرام ممکن است مفید باشد اگر این مشکل ادامه یافت یا شدیدتر شد با پزشک خود مشورت کنید.
- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود، برای رفع نگرانی موقتی از آدامس یا آب نبات دارای شیرینی کم یا تکه‌های یخ در دهان استفاده نمایید. اگر خشکی دهان شما بیش از دو هفته ادامه یافت با پزشک یا دندانپزشک خود مشورت نمایید.
- این دارو ممکن است حساسیت پوست شما را نسبت به نور خورشید بیشتر نماید. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید پرهیز کنید.

قطع ناگهانی دارو در پی مصرف طولانی ممکن است عوارض جانبی زیر را ایجاد کند در این صورت به پزشک خود اطلاع دهید:

- سردرد، تحریک پذیری، تهوع، استفراغ یا اسهال، بیقراری، اشکال در به خواب رفتن و هیجانات غیر معمول.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- انجام هرگونه آزمایشات پزشکی
- انجام هرگونه عمل جراحی، معاینات و اقدامات مرتبط با دندانپزشکی یا معالجات اضطراری
- دارا بودن ناراحتی یا بیماری‌هایی از قبیل آسم، مانیفک دپرسیو، اختلالات خونی، تشنج، اشکال در دفع ادرار، بزرگ شدن پروستات، گلوکوم یا افزایش فشار داخل چشم، بیماری‌های قلبی، افزایش فشارخون، شیزوفرنی، نارسایی کلیوی یا کبدی، فعالیت بیش از حد غده تیروئید، مشکلات گوارشی

تداخلات دارویی:

داروهای تیروئید، باربیتورات‌ها، فنوتیازینها، سایمتیدین، گلوئیدین، گوانتیدین، گواناندول، فلوکستین، بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز، سیمپاتومیمتیک‌ها.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک بر حسب سن بیمار و نوع بیماری تعیین می‌کند.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:

- تاری دید، گیجی، بیبوست به خصوص در سالمندان، اشکال در صحبت کردن یا بلعیدن، درد چشم، ضعف و ناتوانی جسمی، ضربانات نامنظم قلب، توهم، کاهش کنترل تعادل، عصبانیت یا بیقراری، احتیاس ادرار، لرزش عضلات، دشواری در راه رفتن، سفت و سخت شدن دست و پا، افت فشارخون.

شرایط نگهداری:

- دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

قرص روکشدار ۲۵ میلی‌گرم: ۵ بلیستر ۲۰ عددی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۲۲۲۳
www.parsdarou.ir

ساخت (پارس دارو)
تهران - ایران



دزیپرامین

قرص روکش دار ۲۵ میلی گرمی

دسته دارویی:

ضد افسردگی سه حلقه‌ای

موارد مصرف دارو:

افسردگی

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقادیر تجویز شده تجاوز نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه غذا میل نمایید.
- گاهی اوقات برای شروع اثر درمانی لازم است چند هفته این دارو مصرف گردد روند بهبودی بیماری شما با مراجعات مکرر به پزشک خود تحت کنترل خواهد بود.

موارد منع مصرف:

- دارا بودن هر نوع واکنش غیر عادی یا حساسیتی نسبت به این دارو یا سایر داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، کاربامازپین، مایپروتیلین و ترازودون.

مصرف در بارداری و شیردهی:

گروه C، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

احتیاطات:

- این دارو ممکن است سبب خواب‌آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- این دارو ممکن است در هنگام تغییر وضعیت از حالت درازکش به نشسته ایجاد سرگیجه و ضعف جسمانی نماید، برخاستن آرام ممکن است مفید باشد اگر این مشکل ادامه یافت یا شدیدتر شد با پزشک خود مشورت کنید.
- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود، برای رفع نگرانی موقتی از آدامس یا آب نبات دارای شیرینی کم یا تکه‌های یخ در دهان استفاده نمایید. اگر خشکی دهان شما بیش از دو هفته ادامه یافت با پزشک یا دندانپزشک خود مشورت نمایید.
- این دارو ممکن است حساسیت پوست شما را نسبت به نور خورشید بیشتر نماید. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید پرهیز کنید.

قطع ناگهانی دارو در پی مصرف طولانی ممکن است عوارض جانبی زیر را ایجاد کند در این صورت به پزشک خود اطلاع دهید:

- سردرد، تحریک پذیری، تهوع، استفراغ یا اسهال، بیقراری، اشکال در به خواب رفتن و هیجانات غیر معمول.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- انجام هرگونه آزمایشات پزشکی
- انجام هرگونه عمل جراحی، معاینات و اقدامات مرتبط با دندانپزشکی یا معالجات اضطراری
- دارا بودن ناراحتی یا بیماری‌هایی از قبیل آسم، مانیفک دپرسیو، اختلالات خونی، تشنج، اشکال در دفع ادرار، بزرگ شدن پروستات، گلوکوم یا افزایش فشار داخل چشم، بیماری‌های قلبی، افزایش فشارخون، شیزوفرنی، نارسایی کلیوی یا کبدی، فعالیت بیش از حد غده تیروئید، مشکلات گوارشی

تداخلات دارویی:

داروهای تیروئید، باربیتورات‌ها، فنوتیازینها، سایمتیدین، گلوئیدین، گوانتیدین، گواناندول، فلوکستین، بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز، سیمپاتومیمتیک‌ها.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک بر حسب سن بیمار و نوع بیماری تعیین می‌کند.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:

- تاری دید، گیجی، بیبوست به خصوص در سالمندان، اشکال در صحبت کردن یا بلعیدن، درد چشم، ضعف و ناتوانی جسمی، ضربانات نامنظم قلب، توهم، کاهش کنترل تعادل، عصبانیت یا بیقراری، احتیاس ادرار، لرزش عضلات، دشواری در راه رفتن، سفت و سخت شدن دست و پا، افت فشارخون.

شرایط نگهداری:

- دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

قرص روکشدار ۲۵ میلی‌گرم: ۵ پلیستر ۲۰ عددی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۲۷۳۳
www.parsdarou.ir

ساخت (پارس دارو)
تهران - ایران

