

## درماسینول® ۰/۰۲۵ درصد فلوئوسینولون (پماد و کرم موضعی)

درماسینول ۰/۰۲۵ درصد به صورت کرم و پماد موضعی در بسته بندی ۱۵ گرمی داخل جعبه همراه با بروشور توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

### موارد مصرف دارو

فلوئوسینولون از دسته دارویی ضد التهاب استروئیدی می‌باشد و کرم و پماد موضعی آن در درمان درماتوزهای حساس و پاسخگو به کورتیکواستروئیدها، درماتیت آتوپیک، لیکن پلاس، پسوریازیس در بزرگسالان و کودکان، اگزما و آفتاب سوختگی به کار می‌رود.

### راهنمایی‌های عمومی برای بیمار

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
- دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید.
- فقط برای استعمال خارجی می‌باشد و از تماس دارو با چشم‌ها و اطراف آن خودداری نمایید.
- در صورت عدم بهبودی علائم در طول یک هفته و یا تشدید آنها، با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورتی که این محصول در صورت و یا در کودکان زیر یک سال استفاده گردد طول مدت مصرف از ۵ روز بیشتر نباشد. در صورت لزوم استفاده طولانی تر با پزشک خود مشورت نمایید.

### موارد منع مصرف

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای دیگر این دارو مصرف این دارو برای کودکان کمتر از یک سال تایید نشده است.

### مصرف در بارداری و شیردهی

- در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص تجویز شود.

### هشدارها

- مصرف این دارو به مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد برخی عوارض ناخواسته شود.
- برای مصرف کودکان از مقدار ۲ گرم در روز تجاوز نکنید.
- از پوشاندن موضع تحت درمان با پانسمان و بانداز خودداری نمایید، مگر در صورتیکه پزشک توصیه کرده باشد.

### احتیاطات

- به صورت یک لایه نازک روی موضع آسیب دیده مالیده شود، یا یک قسمت از بدن تحت درمان با این دارو قرار گیرد.
- اگر در ناحیه تحت درمان، تحریک و یا خارش اتفاق افتاد، از ادامه مصرف این دارو خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به عفونت‌های پوستی، آکنه و یا روزاسه این دارو را با احتیاط استفاده نمایید.
- پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی

- در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:
- میتراپون، وریکونازول

### مقدار و نحوه مصرف دارو

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:
- کودکان و بزرگسالان:
- لایه نازکی از کرم و پماد را به صورت روزانه یک یا دو بار به موضع آسیب دیده مالیده و به آرامی ماساژ دهید.

### عوارض جانبی دارو

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

- **عوارض شایع:** واکنش‌های حساسیت پوستی (مانند سوزش، درد، خارش)، علائم عفونت، فولیکولیت

- **عوارض نادر:** درماتیت، استریا، بثورات شبیه آکنه

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

### شرایط نگهداری دارو

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳  
www.parsdarou.ir

ساخت پارس دارو  
تهران - ایران

