# فلوکستین

## کپسول ۲۰ میلی‌گرم

**دسته دارویی:**

مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین

**موارد مصرف دارو:**

افسردگی، اختلال وسواس اجباری، پر خوری عصبی، اختلالات خلق پیش از قاعدگی

**راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:**

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقادیر تجویز شده تجاوز نکنید. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- در صورت داشتن ناراحتی معده، دارو را همراه غذا میل نمایید.
- در صورتیکه این دارو برای درمان افسردگی مصرف شود بهبود وضعیت بیمار ممکن است تا مدت ۴ هفته یا بیشتر طول بکشد.
- در صورتیکه این دارو برای درمان وسواس مصرف شود بهبود وضعیت بیمار ممکن است تا مدت ۵ هفته یا بیشتر طول بکشد.
- در صورتیکه این دارو برای کاهش وزن مصرف شود بهبود وضعیت بیمار ممکن است از ۱ تا ۴ هفته یا بیشتر طول بکشد.

**موارد منع مصرف:**

- دارا بودن هر نوع واکنش غیر عادی و حساسیتی نسبت به این دارو

**مصرف در بارداری و شیردهی:**

گروه C، مصرف این دارو در دوران بارداری بخصوص سه ماهه اول حتماً تحت نظر پزشک انجام گیرد. مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع می‌باشد.

**احتیاطات:**

- مصرف این دارو موجب خواب‌آلودگی می‌گردد، بنابراین ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- تا دو هفته پس از قطع مصرف بازدارنده‌های MAO، فلوکستین مصرف نشود و تا ۵ هفته پس از قطع مصرف فلوکستین، بازدارنده‌های MAO مصرف نگردد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- داشتن بیماری‌هایی نظیر کندی ذهن، سابقه صرع و تشنج، دیابت، نارسایی کلیوی و کبدی، بیماری پارکینسون و پایین بودن وزن بدن
- در صورت بروز حساسیت پوستی، راش پوستی یا کهیر
- بروز علائمی مثل رفتار غیر عادی، بدتر شدن افسردگی، افکار خودکشی
- در صورت تغییر در تست قند خون و ادرار در بیماران دیابتی

**تداخلات دارویی:**

- الکل، آلپرازولام، دیازپام، آنتی‌دیپرسان سه حلقه‌ای (TCAs)، آسپیرین و یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، استمیزول، کاربامازپین، هالوپریدول، لوکساپین، فنوتیازین‌ها، تیوگزانتن‌ها، وارفارین، لیتیم، ماپروتیلین، ترازودون، بازدارنده‌های مونوآمین‌اکسیداز، داروهای سرتونرژیک، سوماتریپتان، تیوریدازین، فنی توئین.

**مقدار و نحوه مصرف دارو:**

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می‌باشد:

۲۰ میلی‌گرم روزانه هنگام صبح مصرف می‌شود که در صورت نیاز این مقدار می‌تواند افزایش یابد.

**عوارض جانبی دارو:**

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:

**عوارضی که نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند:**

**عوارض شایع تر:**

- بی‌قراری، کاهش توان جنسی، راش پوستی، کهیر یا خارش

**عوارض با شیوع کمتر:**

- تب و لرز، درد مفاصل یا ماهیچه، اختلالات بینایی

**عوارض نادر:**

- خونریزی غیر معمول (نقاط بنفش یا قرمز روی پوست)، درد و تورم سینه‌ها، تنگی نفس، ترشح غیر معمول شیر در خانم‌ها، کاهش قند خون، اختلال حرکتی، تپش قلب، حملات صرع، تشنج، علائم ناشی از کاهش سدیم خون: اضطراب، تشنج، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، افزایش تشنگی، فقدان انرژی، اسهال، اشکال در تنفس، حرکات غیر طبیعی در بدن یا صورت

**شرایط نگهداری:**

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

**بسته بندی:**

۱۰ بلیستر ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی.

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران

صدای مشتری: ۳۷۳ ۷۴-۰۲۱
www.parsdarou.ir
Reference: USP DI 2007

# فلوکستین
## کپسول ۲۰ میلی‌گرم

**دسته دارویی:**
مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین

**موارد مصرف دارو:**
افسردگی، اختلال وسواس اجباری، پر خوری عصبی، اختلالات خلق پیش از قاعدگی

**راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:**
- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقادیر تجویز شده تجاوز نکنید. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- در صورت داشتن ناراحتی معده، دارو را همراه غذا میل نمایید.
- در صورتیکه این دارو برای درمان افسردگی مصرف شود بهبود وضعیت بیمار ممکن است تا مدت ۴ هفته یا بیشتر طول بکشد.
- در صورتیکه این دارو برای درمان وسواس مصرف شود بهبود وضعیت بیمار ممکن است تا مدت ۵ هفته یا بیشتر طول بکشد.
- در صورتیکه این دارو برای کاهش وزن مصرف شود بهبود وضعیت بیمار ممکن است از ۱ تا ۴ هفته یا بیشتر طول بکشد.

**موارد منع مصرف:**
- دارا بودن هر نوع واکنش غیر عادی و حساسیتی نسبت به این دارو

**مصرف در بارداری و شیردهی:**
گروه C، مصرف این دارو در دوران بارداری بخصوص سه ماهه اول حتماً تحت نظر پزشک انجام گیرد. مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع می‌باشد.

**احتیاطات:**
- مصرف این دارو موجب خواب‌آلودگی می‌گردد، بنابراین ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- تا دو هفته پس از قطع مصرف بازدارنده‌های MAO، فلوکستین مصرف نشود و تا ۵ هفته پس از قطع مصرف فلوکستین، بازدارنده‌های MAO مصرف نگردد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- داشتن بیماری‌هایی نظیر کندی ذهن، سابقه صرع و تشنج، دیابت، نارسایی کلیوی و کبدی، بیماری پارکینسون و پایین بودن وزن بدن
- در صورت بروز حساسیت پوستی، راش پوستی یا کهیر
- بروز علائمی مثل رفتار غیر عادی، بدتر شدن افسردگی، افکار خودکشی
- در صورت تغییر در تست قند خون و ادرار در بیماران دیابتی

**تداخلات دارویی:**
- الکل، آلپرازولام، دیازپام، آنتی‌دیپرسان سه حلقه‌ای (TCAs)، آسپیرین و یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، استمیزول، کاربامازپین، هالوپریدول، لوکساپین، فنوتیازین‌ها، تیوگزانتن‌ها، وارفارین، لیتیم، ماپروتیلین، ترازودون، بازدارنده‌های مونوآمین‌اکسیداز، داروهای سرتونرژیک، سوماتریپتان، تیوریدازین، فنی توئین.

**مقدار و نحوه مصرف دارو:**
مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می‌باشد:

۲۰ میلی‌گرم روزانه هنگام صبح مصرف می‌شود که در صورت نیاز این مقدار می‌تواند افزایش یابد.

**عوارض جانبی دارو:**
هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:

**عوارضی که نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند:**

**عوارض شایع تر:**
- بی‌قراری، کاهش توان جنسی، راش پوستی، کهیر یا خارش

**عوارض با شیوع کمتر:**
- تب و لرز، درد مفاصل یا ماهیچه، اختلالات بینایی

**عوارض نادر:**
- خونریزی غیر معمول (نقاط بنفش یا قرمز روی پوست)، درد و تورم سینه‌ها، تنگی نفس، ترشح غیر معمول شیر در خانم‌ها، کاهش قند خون، اختلال حرکتی، تپش قلب، حملات صرع، تشنج، علائم ناشی از کاهش سدیم خون: اضطراب، تشنج، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، افزایش تشنگی، فقدان انرژی، اسهال، اشکال در تنفس، حرکات غیر طبیعی در بدن یا صورت

**شرایط نگهداری:**
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

**بسته بندی:**
۱۰ بلیستر ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی.

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران
صدای مشتری: ۳۷۳ ۷۴-۰۲۱
www.parsdarou.ir
Reference: USP DI 2007

1788C PANTONE
Black