

- در درمان درد، تب و گلودرد، در صورت مشاهده موارد زیر فوراً به پزشک مراجعه کنید: در صورت ادامه یافتن درد در بزرگسالان به مدت ۱۰ روز و در کودکان ۵ روز.
- در صورت ادامه یافتن تب به مدت ۳ روز و همراه با نشانه‌هایی از سرخی و تورم.
- در صورت ادامه یافتن گلودرد به مدت ۲ روز و همراه با نشانه‌هایی از تب، سردرد، التهاب یا استفراغ.

تداخلات دارویی:

استامینوفن و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، اسیدکننده‌ها و قلیایی‌کننده‌های ادرار، کومارین با مشتقات اینداندینون، هپارین، عوامل ترومبولیتیک، داروهای ضد دیابت خوراکی و انسولین، سفامندول، سفوپرازون، سفوتتان، پلیسامپسین، والپروئیک اسید، متوترکسات، وانکوماسین، مهارکننده‌های تجمع پلاکتها، پروبنسید، سولفین پیرازون، آنتاسیدها، داروهای ضد تشنج، الکل، لاکتاسیوهای حاوی سلولز، کورتیکواستروئیدها، فروسیماید، سالیسیلیک اسید یا سالیسیلات‌های موضعی، ویتامین K، زیدوودین، آنتاگونیست‌های گیرنده‌های H2 مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک برحسب سن بیمار و نوع بیماری تعیین می‌کند.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید.

واکنش‌های آنافیلاکسی (فلاشینگ یا قرمزی پوست، سرفه، اشکال در بلع، سرگیجه و احساس بی‌حالی، راش پوستی، کهیر و خارش، گرفتگی بینی، ورم پلک، صورت با لب‌ها، احساس تنگی و گرفتگی در قفسه سینه، مشکل تنفس یا خس خس سینه به خصوص در بیماران آسماتیک)، آنمی (خستگی یا ضعف غیر طبیعی و خونریزیهای جزئی دستگاه گوارش)، آنمی همولیتیک (مشکل تنفس، خستگی یا ضعف غیر طبیعی به خصوص در بیماران با نقصان G6PD)، واکنش‌های پوستی (راش پوستی، کهیر، خارش)، زخم دستگاه گوارشی همراه با خونریزی (درد معده، مدفوع سیاه یا خونی، استفراغ خونی)، واکنش‌های حساسیتی برونکواسپاسم (کوتاهی تنفس، مشکل تنفسی، گرفتگی یا خس خس سینه)

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت (پارس دارو)، تهران-ایران



صدای مشتری: ۳۷۲ ۷۴-۲۱
www.parsdarou.ir

Reference: USP DI 2007
Drug facts 2015

آ.اس.آ

استیل سالیسیلیک اسید

قرص انتریک کوند ۸۰ میلی‌گرم، قرص جویدنی ۱۰۰ میلی‌گرم
قرص میکروکوند ۵۰۰ میلی‌گرم

دسته دارویی:

آنالژزیک و ضد التهاب غیر استروئیدی

موارد مصرف دارو:

تب، درد، التهاب، آرتریت روماتوئید، آرتروز، آرتریت جوانان، تب روماتیسمی، تجمع پلاکت‌ها، انفارکتوس میوکاردیال
راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.
 - در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن رانصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
 - دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
 - جهت جلوگیری از عوارض گوارشی دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.
 - دارو را با یک لیوان پر از آب میل نمایید و به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه دراز نکشید.
- موارد منع مصرف:
- سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر سالیسیلات‌ها شامل متیل سالیسیلات، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)، رنگدانه تارترازین.
- مصرف در بارداری و شیردهی:
- گروه D. این دارو از جفت عبور می‌کند و در شیر مادر ترشح می‌شود لذا مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی می‌بایست حتماً با نظر پزشک انجام گیرد.
- احتیاطات:

- در صورت داشتن بیماری‌های زیر پزشک خود را مطلع سازید: هموراژیک، هموفیلی یا سایر مشکلات خونی، آنژیوادم، آنافیلاکسی، آسم، پولیپ، بیماری‌های قلبی، ورم معده، زخم‌های گوارشی، تقریب، اختلال در عملکرد کبدی، عفونت‌های ویروسی، بیماری‌های تب دار مانند آنفلوآنزا و ابله مرغان خصوصاً در کودکان و نوجوانان.
- در صورتی که دارو بویی شبیه سرکه می‌دهد از مصرف آن خودداری نمایید.
- در صورت مصرف این دارو به عنوان مهارکننده تجمع پلاکت‌ها، بدون مشورت پزشک درمان را متوقف نکنید و تنها مقدار توصیه شده آسپیرین را میل نمایید که متمایز از میزان مصرف آن در شرایط تب، درد یا آرتریت می‌باشد.
- در صورتی که مدت طولانی یا دوز بالایی از دارو را مصرف می‌کنید به طور مرتب تحت نظر پزشک باشید و در صورت بروز علائم سردرد و وزوز گوش فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
- تا یک هفته بعد از عمل لوزه یا کشیدن دندان از مصرف آسپیرین یا ترکیبات آن خودداری کنید.