



ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران

صدای مشرق: ۳۷۴ ۰۲۱-۷۴
www.parsdarou.ir

- در صورت داشتن گلو درد شدید که بیش از دو روز ادامه داشته و یا تب و سردرد و تهوع و راش پوستی و یا استفراغ همراه باشد ، قبل از مصرف حتماً با پزشک مشورت شود.
- در صورت مصرف همزمان این دارو با سایر دارو های حاوی استامینوفن ، آسپرین سالیسلانها ، دارو های فشار خون ، آنتی کولینرژیک ها و دارو های ضد افسردگی با پزشک خود مشورت نمایید .
- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی یا ایجاد سرگیجه شود .لذا ضمن درمان ، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید .

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید :
 - آنتی هیستامین ها – داروهای خواب آور
 - دارو های سمپاتومیمتیک و منقبض کننده عروق
 - باریتورات ها (مانند فنوباربیتال) ، سولفین پیرازون ، لاموتریزین ، وارفارین ، متوکلوپیرامید ، پروبنسید ، اینتر فرون آلفا ، زیدوودین

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

– بزرگسالان و نوجوانان :

۲ عدد هر ۴ تا ۶ ساعت

از مصرف دوز فراموش شده و از دو برابر کردن یا افزایش دوز دارو در نوبت بعدی خودداری کنید .

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود ، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند ، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید .
عوارض شایع :اختلالات خون ، زردی، آسیب کبدی، گلوکوم،تاری دید ، واکنش های آلرژیک (مانند راش پوستی) ، خشکی دهان ،اضطراب،گیجی، افزایش فشار خون، تهوع، بی خوابی، احتباس ادرار .
عوارض نادر :اختلالات کبدی، مشکلات گوارشی،کلافگی
در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید .

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی انتقال دهید .

شرایط نگهداری دارو :

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .

سرماخوردگی بزرگسالان

(استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم / فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم /کلرفنیرآمین مالئات ۲ میلی گرم)

کپسول ژلاتینی نرم

کپسول سرماخوردگی به صورت کپسول ژلاتینی نرم ، با دوز استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم / فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم /کلرفنیرآمین مالئات ۲ میلی گرم در بسته بندی ۲۰ عددی توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می گردد .

موارد مصرف دارو :

ضد درد و ضد تب ، ضد احتقان و آنتی هیستامین
این فرآورده علاوه بر استامینوفن ، حاوی فنیل افرین هیدروکلراید به عنوان ضد احتقان و کلرفنیرآمین مالئات به عنوان آنتی هیستامین می باشد که جهت تسکین احتقان بینی، درد سینوس، سر درد و کاهش علائم ناشی از سرما خوردگی، آنفولانزا و حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد و موجب بهبود احتقان و ترشحات بینی و کاهش عطسه می شود .

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید .
- دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید .
- دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید .
- این دارو را میتوانید با آب ، غذا و یا شیر مصرف نمایید .
- این دارو بدون نسخه پزشک می تواند مصرف شود .

موارد منع مصرف :

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به آنتی هیستامین ها ، آمین های سمپاتومیمتیک
- در صورت نارسایی شدید کبدی و بیماری های فعال کبدی
- در صورت استفاده از نوشیدنی های حاوی الکل
- در صورت داشتن فشار خون بالا به دلیل وجود فنیل افرین و پرکاری شدید تیروئید
- در صورت حساسیت به ژلاتین و رنگ

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص تجویز شود .

هشدارها:

- این دارو در اختلالات خفیف کلیوی با احتیاط مصرف شود و از مصرف آن در نارسایی های متوسط و حاد کلیوی وکبدی پرهیز نمایید .
 - از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده خودداری کنید .
 - کپسول ژلاتینی نرم را بلعید و از جویدن آن پرهیز ید .
- احتیاطات :

- در صورت مصرف الکل و داشتن هرگونه بیماری های کلیوی، کبدی قلبی و عروقی، دیابت، بزرگی پروستات، گلوکوم زاویه بسته، زخم معده و تیروئید پر کار ، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید .

- در صورت داشتن گلو درد شدید که بیش از دو روز ادامه داشته و یا تب و سردرد و تهوع و راش پوستی و یا استفراغ همراه باشد ، قبل از مصرف حتما با پزشک مشورت شود.
- در صورت مصرف همزمان این دارو با سایر دارو های حاوی استامینوفن ، آسپرین سالیسلانها ، دارو های فشار خون ، آنتی کولینرژیک ها و دارو های ضد افسردگی با پزشک خود مشورت نمایید .
- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی یا ایجاد سرگیجه شود .لذا ضمن درمان ، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید .

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید :

– آنتی هیستامین ها – داروهای خواب آور

– دارو های سمپاتومیمتیک و منقبض کننده عروق

– باریتورات ها (مانند فتوباریتال) ، سولفین پیرازون ، لاموتریزین ، وارفارین ، متوکلوپیرامید ،

پروبنسید ، اینتر فرون آلفا ، زیدوودین

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

– بزرگسالان و نوجوانان :

۲ عدد هر ۴ تا ۶ ساعت

از مصرف دوز فراموش شده و از دو برابر کردن یا افزایش دوز دارو در نوبت بعدی خودداری کنید .

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود ، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند ، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید .
عوارض شایع : اختلالات خون ، زردی ، آسیب کبدی ، گلوکوم ، تاری دید ، واکنش های آلرژیک (مانند راش پوستی) ، خشکی دهان ، اضطراب ، گیجی ، افزایش فشار خون ، تهوع ، بی خوابی ، احتباس ادرار .

عوارض نادر : اختلالات کبدی ، مشکلات گوارشی ، کلافگی

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است ، با پزشک ، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید .

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده ، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی انتقال دهید .

شرایط نگهداری دارو :

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .

صدای مشتری : ۰۲۱-۷۴ ۳۷۴
www.parsdarou.ir

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران

سرماخوردگی بزرگسالان

(استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم / فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم / کلرفنیرآمین مالئات ۲ میلی گرم)

کپسول ژلاتینی نرم

کپسول سرماخوردگی به صورت کپسول ژلاتینی نرم ، با دوز استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم / فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم / کلرفنیرآمین مالئات ۲ میلی گرم در بسته بندی ۲۰ عددی توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می گردد .

موارد مصرف دارو :

ضد درد و ضد تب ، ضد احتقان و آنتی هیستامین

این فرآورده علاوه بر استامینوفن ، حاوی فنیل افرین هیدروکلراید به عنوان ضد احتقان و کلرفنیرآمین مالئات به عنوان آنتی هیستامین می باشد که جهت تسکین احتقان بینی ، درد سینوس ، سر درد و کاهش علائم ناشی از سرما خوردگی ، آنفولانزا و حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد و موجب بهبود احتقان و ترشحات بینی و کاهش عطسه می شود .

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید .
- دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید .
- دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید .
- این دارو را میتوانید با آب ، غذا و یا شیر مصرف نمایید .
- این دارو بدون نسخه پزشک می تواند مصرف شود .

موارد منع مصرف :

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به آنتی هیستامین ها ، آمین های سمپاتومیمتیک
- در صورت نارسایی شدید کبدی و بیماری های فعال کبدی
- در صورت استفاده از نوشیدنی های حاوی الکل
- در صورت داشتن فشار خون بالا به دلیل وجود فنیل افرین و پرکاری شدید تیروئید
- در صورت حساسیت به ژلاتین و رنگ

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص تجویز شود .

هشدارها:

- این دارو در اختلالات خفیف کلیوی با احتیاط مصرف شود و از مصرف آن در نارسایی های متوسط وحاد کلیوی و کبدی پرهیز نمایند .
- از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده خودداری کنید .
- کپسول ژلاتینی نرم را بلعید و از جویدن آن پرهیزید .

احتیاطات :

- در صورت مصرف الکل و داشتن هر گونه بیماری های کلیوی ، کبدی قلبی و عروقی ، دیابت ، بزرگی پروستات ، گلوکوم زاویه بسته ، زخم معده و تیروئید پر کار ، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید .

