

پنوکساید® ۵ و ۱۰ درصد بنزوئیل پراکساید ژل موضعی

بنزوئیل پراکساید با نام تجاری پنوکساید® به صورت ژل موضعی با دوزهای ۵ و ۱۰ درصد در بسته بندی ۳۰ گرمی در جعبه یک عددی به بازار عرضه می شود.

موارد مصرف دارو :

- ژل موضعی بنزوئیل پراکساید دارای خاصیت ضد باکتری، خشک کننده پوست و ضد آکنه است. برای درمان آکنه و لگاریس خفیف تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.
- راهنمایی های عمومی برای بیمار :
- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

- دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید.
- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.
- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک برسانید :
- در صورت بارداری و یا شیر دهی- وجود هر گونه حساسیت- استفاده از سایر داروها

موارد منع مصرف :

- وجود هر گونه حساسیت بیش از حد به بنزوئیل پراکساید، یا سایر مواد تشکیل دهنده این دارو.
- اطلاعات کافی در رابطه با استفاده این دارو برای کودکان زیر ۱۲ سال موجود نیست.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط تجویز شود.

هشدارها:

- از تماس دارو با چشم، پلک، لب، غشاهای مخاطی و پوست ملتهب و آسیب دیده خودداری کنید.
- در صورت برخورد آن را با آب به خوبی شستشو دهید.

احتیاطات:

- مصرف این دارو با مشتقات اسید بنزوئیک (به عنوان مثال دارچین، داروهای بی حس کننده موضعی خاص)، ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود.
- در ابتدای مصرف ممکن است مقداری قرمزی و پوسته ریزی دیده شود که با گذشت زمان حل می شود. برای کاهش خطر تحریک پوست، درمان به صورت استفاده متناوب یا تماس کوتاه مدت شروع شود (مانند شستشو پس از یک ساعت) و بعد از ایجاد تحمل به این موارد، از روش مصرف استاندارد پیروی گردد.
- در طول دوره درمان از قرار گرفتن مکرر در معرض نور خورشید و لامپ های خورشیدی خودداری نمایید.

- هنگام استفاده از این محصول از قرار گرفتن غیر ضروری در معرض نور خورشید خودداری کنید و در طول درمان از کرم ضد آفتاب و پوشش محافظتی مناسب استفاده کنید.
- از مصرف همزمان با سایر فرآورده های ضد جوش یا پوسته ریز خودداری کنید.
- در صورت ایجاد تحریک و التهاب شدید پوست، یا پزشک مشورت و مصرف دارو را قطع کنید.
- تا یک ساعت پس از استفاده از این دارو، از مصرف سایر محصولات موضعی در همان منطقه خودداری کنید.
- این دارو ممکن است باعث از بین رفتن رنگ مو و یا پارچه های رنگی شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:
- ترتینوئین، کلیندامایسین، فلوئوسینولون، هیدروکورتیزون، ایزوترتینوئین، سالیسیلیک اسید و بی حس کننده های موضعی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

قبل از استفاده از بنزوئیل پراکساید، ناحیه آسیب دیده را با یک پاک کننده غیر دارویی شسته و خشک نمایید سپس دارو را به اندازه کافی برای پوشاندن ناحیه، استفاده کرده و به آرامی مالش دهید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان - کودکان بزرگتر از ۱۲ سال :

- روزانه ۱ تا ۲ بار ژل را در محدوده مورد نظر مصرف و به آرامی مالش دهید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

• عوارض شایع:

واکنش های آلرژیک (قرمزی و تورم پوست)، خشک شدن شدید پوست، اریتم پوستی (سرخ شدن پوست ناشی از افزایش جریان خون در برخی نواحی)

• عوارض نادر:

سوزش، خارش و خشکی پوست.

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سلتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.

