بیتوریت®
متوپرولول سوکسینات ۴۷/۵ میلی‌گرم
قرص پیوسته رهش خط دار

قرص پیوسته رهش خط دار متوپرولول سوکسینات با نام تجاری بیتوریت® با دوز ۴۷/۵ میلی گرم در جعبه ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) توسط شرکت پارس دارو تولید و به بازار عرضه می گردد.

موارد مصرف:

بیتوریت® با مکانیسم مهار انتخابی گیرنده های بتا در موارد زیر کاربرد دارد:

- پایین آورنده فشار خون
- آنژین صدری
- نارسایی قلبی
- آریتمی قلبی

راهنمای عمومی برای بیمار

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف موارد زیر را به اطلاع پزشک و یا داروساز برسانید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف

در صورت وجود موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به متوپرولول و سایر داروهای مهار کننده گیرنده بتا و یا سایر ترکیبات موجود در فرآورده
- برادی کاردی شدید
- شوک و یا نارسایی قلبی
- انسداد درجه ۲ و یا ۳ گره بطنی - دهلیزی (AV)
- برونکواسپاسم

مصرف در بارداری و شیردهی

- **بارداری:** این دارو رده C می باشد و به دلیل عدم مطالعات کافی در دوران بارداری، مصرف بیتوریت® در دوران بارداری فقط در صورت لزوم و زیر نظر پزشک معالج امکان پذیر است.
- **شیردهی:** به دلیل عدم مطالعات کافی در دوران شیردهی، مصرف بیتوریت® در دوران شیردهی زیر نظر پزشک معالج امکان پذیر است.

هشدارها

- این دارو می تواند در بیماران مبتلا به دیابت، در مصارف طولانی مدت باعث پوشاندن علائم افت قند خون (نظیر تاکی کاردی) و همچنین می تواند باعث افزایش قند خون شود.
- در دوزهای بالاتر احتمال بروز عارضه نارسایی قلبی افزایش می یابد.

احتیاط

- قطع مصرف دارو باید زیر نظر پزشک صورت گیرد.
- در صورت افزایش وزن و یا مشکل در تنفس، پزشک معالج را مطلع نمایید.
- به دلیل احتمال بروز عارضه گیجی، در طول دوره درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در نارسایی کبدی نیاز به تنظیم دوز وجود دارد.
- در بیماری فئوکروموسیتوما با احتیاط مصرف شود.

تداخلات دارویی

در صورت مصرف داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

- مهار کننده های سیتوکروم **P450** نظیر داروهای ضد افسردگی (نظیر فلوکستین، دلوکستین و پاروکستین و ...)، پروپافنون و یا کینیدین که موجب افزایش غلظت خونی متوپرولول می‌گردد.
- **MAOIs** (نظیر سلژیلین ، فنلزین و ...) به دلیل تشدید اثر متوپرولول باعث سرگیجه و افت فشار خون می شود.
- سایر داروها چون ایبراترون ، فنوباربیتال ، پریمیدون ، بوپروپیون ، ریفامپین و تربینافین

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار مصرف دارو: مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول متوپرولول سوکسینات در بزرگسالان به شرح زیر است:

- **فشارخون بالا:**

دوز مصرفی ۴۷/۵ میلی‌گرم یکبار در روز می باشد و در صورت نیاز می تواند افزایش یابد و یا در کنار سایر داروهای کاهنده فشارخون مصرف شود.

- **آنژین صدری :**

دوز مصرفی ۴۷/۵ تا ۱۹۰ میلی‌گرم یکبار در روز می باشد.

- **تاکی‌کاردی :**

دوز مصرفی ۴۷/۵ تا ۱۹۰ میلی‌گرم یکبار در روز می باشد.

توجه : قبل از شروع درمان با متوپرولول سوکسینات ، دوز سایر داروها از جمله دیورتیک ها (فوروزماید) ، **ACEIs** (انالاپریل ، کاپتوپریل ...) و یا دیگوکسین باید در ابتدا تنظیم شود.

- بی خطری و کارایی دارو در کودکان بررسی نشده است.

نحوه مصرف دارو :

- دارو را به صورت روزانه و در زمان مشخصی مصرف نمایید.
- دارو را همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی

عوارض شایع : برادیکاردی (کاهش ضربان قلب) ، برونکواسپاسم ، گیجی ، نارسایی احتقانی قلبی ، ویزینگ (خس خس سینه) ، افسردگی ، گیجی و کاهش گردش خون محیطی (سردی دست و پا)

عوارض نادر : واکنش های حساسیتی (راش) ، آریتمی ، درد پشت و یا مفاصل ، درد قفسه سینه ، ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)

شرایط نگهداری دارو

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران
www.parsdarou.ir صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

بیتوریت®
متوپرولول سوکسینات ۴۷/۵ میلی‌گرم
قرص پیوسته رهش خط دار

قرص پیوسته رهش خط دار متوپرولول سوکسینات با نام تجاری بیتوریت® با دوز ۴۷/۵ میلی گرم در جعبه ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) توسط شرکت پارس دارو تولید و به بازار عرضه می گردد.

موارد مصرف:

بیتوریت® با مکانیسم مهار انتخابی گیرنده های بتا در موارد زیر کاربرد دارد:

- پایین آورنده فشار خون
- آنژین صدری
- نارسایی قلبی
- آریتمی قلبی

راهنمای عمومی برای بیمار

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف موارد زیر را به اطلاع پزشک و یا داروساز برسانید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف

در صورت وجود موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به متوپرولول و سایر داروهای مهار کننده گیرنده بتا و یا سایر ترکیبات موجود در فرآورده
- برادی کاردی شدید
- شوک و یا نارسایی قلبی
- انسداد درجه ۲ و یا ۳ گره بطنی - دهلیزی (AV)
- برونکواسپاسم

مصرف در بارداری و شیردهی

- **بارداری:** این دارو رده C می باشد و به دلیل عدم مطالعات کافی در دوران بارداری، مصرف بیتوریت® در دوران بارداری فقط در صورت لزوم و زیر نظر پزشک معالج امکان پذیر است.
- **شیردهی:** به دلیل عدم مطالعات کافی در دوران شیردهی، مصرف بیتوریت® در دوران شیردهی زیر نظر پزشک معالج امکان پذیر است.

هشدارها

- این دارو می تواند در بیماران مبتلا به دیابت، در مصارف طولانی مدت باعث پوشاندن علائم افت قند خون (نظیر تاکی کاردی) و همچنین می تواند باعث افزایش قند خون شود.
- در دوزهای بالاتر احتمال بروز عارضه نارسایی قلبی افزایش می یابد.

احتیاط

- قطع مصرف دارو باید زیر نظر پزشک صورت گیرد.
- در صورت افزایش وزن و یا مشکل در تنفس، پزشک معالج را مطلع نمایید.
- به دلیل احتمال بروز عارضه گیجی، در طول دوره درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در نارسایی کبدی نیاز به تنظیم دوز وجود دارد.
- در بیماری فئوکروموسیتوما با احتیاط مصرف شود.

تداخلات دارویی

در صورت مصرف داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

- مهار کننده های سیتوکروم **P450** نظیر داروهای ضد افسردگی (نظیر فلوکستین، دلوکستین و پاروکستین و ...)، پروپافنون و یا کینیدین که موجب افزایش غلظت خونی متوپرولول می‌گردد.
- **MAOIs** (نظیر سلژیلین ، فنلزین و ...) به دلیل تشدید اثر متوپرولول باعث سرگیجه و افت فشار خون می شود.
- سایر داروها چون ایبراترون ، فنوباربیتال ، پریمیدون ، بوپروپیون ، ریفامپین و تربینافین

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار مصرف دارو: مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول متوپرولول سوکسینات در بزرگسالان به شرح زیر است:

- **فشارخون بالا:**

دوز مصرفی ۴۷/۵ میلی‌گرم یکبار در روز می باشد و در صورت نیاز می تواند افزایش یابد و یا در کنار سایر داروهای کاهنده فشارخون مصرف شود.

- **آنژین صدری :**

دوز مصرفی ۴۷/۵ تا ۱۹۰ میلی‌گرم یکبار در روز می باشد.

- **تاکی‌کاردی :**

دوز مصرفی ۴۷/۵ تا ۱۹۰ میلی‌گرم یکبار در روز می باشد.

توجه : قبل از شروع درمان با متوپرولول سوکسینات ، دوز سایر داروها از جمله دیورتیک ها (فوروزماید) ، **ACEIs** (انالاپریل ، کاپتوپریل ...) و یا دیگوکسین باید در ابتدا تنظیم شود.

- بی خطری و کارایی دارو در کودکان بررسی نشده است.

نحوه مصرف دارو :

- دارو را به صورت روزانه و در زمان مشخصی مصرف نمایید.
- دارو را همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی

عوارض شایع : برادیکاردی (کاهش ضربان قلب) ، برونکواسپاسم ، گیجی ، نارسایی احتقانی قلبی ، ویزینگ (خس خس سینه) ، افسردگی ، گیجی و کاهش گردش خون محیطی (سردی دست و پا)

عوارض نادر : واکنش های حساسیتی (راش) ، آریتمی ، درد پشت و یا مفاصل ، درد قفسه سینه ، ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)

شرایط نگهداری دارو

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران
www.parsdarou.ir صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Black

193C