

کانازول® ۱ درصد

(کلوتریمازول) محلول موضعی

دسته دارویی:

ضد قارچ (موضعی)

موارد مصرف دارو:

این دارو در درمان بیماریهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

کاندید بازیس، تینیاکورپوریس (عفونت قارچی بدن)، تینیاکوروریس (عفونت قارچی کتله ران)، تینیاپدیس (عفونت قارچی لای انگشتان پا یا کف پا)، تینیاورسیکالر

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

• این دارو برای درمان بیماریهای فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

• دوره درمان را کامل کنید.

• دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.

• در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.

• این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

• از تماس دارو با چشم اجتناب نمایید.

• از پوشاندن موضع آغشته به دارو خودداری نمایید. (مگر با توصیه پزشک).

• زمانی که این دارو برای درمان کاندید بازیس مصرف می شود، از پوشاندن موضع به دلیل ایجاد محیط مناسب برای رشد مخمرها و در نتیجه ایجاد سمومی که موجب تحریک موضع می گردند، باید اجتناب گردد.

موارد منع مصرف:

وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو یا داروهای مشابه.

هشدارها:

• بهبود با این دارو معمولاً در هفته اول درمان با تسکین خارش صورت می گیرد. چنانچه پس از ۴ هفته از مصرف دارو بهبودی حاصل نشد، به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

• گروه B، مصرف این دارو در سه ماهه اول بارداری و در دوران شیردهی ممنوع است و در صورت نیاز به مصرف باید منافع دارو به مضار آن در نظر گرفته شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی میزان و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

• مقدار کافی محلول را روزانه دو بار، صبح و عصر روی موضع مورد نظر بمالید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید.

• راش پوستی، کهیر، تاول، سوزش، خارش، قرمزی و پوسته پوسته شدن پوست، احساس گزش، التهاب یا دیگر علائم تحریکات پوستی که قبل از شروع درمان وجود نداشته است.

شرایط نگهداری دارو:

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

پسته بندی:

یک عدد ظرف ۲۰ میلی لیتری به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی.

صدای مشتری: ۰۲۱-۲۴ ۲۳۲
www.parsdarou.ir
Reference: USP DI 2007

ساخت (پارس دارو) «
تهران-ایران



90mm

کانازول® ۱ درصد

(کلوتریمازول)

محلول موضعی

دسته دارویی:

ضد قارچ (موضعی)

موارد مصرف دارو:

این دارو در درمان بیماریهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
کاندید بازیس، تینیاکورپوریس (عفونت قارچی بدن)، تینیاکوروریس (عفونت قارچی کتف)، تینیاکورپوریس (عفونت قارچی لای انگشتان پا یا کف پا)، تینیاکورسیکالر

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماریهای شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.

این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

از تماس دارو با چشم اجتناب نمایید.

از پوشاندن موضع آغشته به دارو خودداری نمایید. (مگر با توصیه پزشک).

زمانی که این دارو برای درمان کاندید بازیس مصرف می شود، از پوشاندن موضع به دلیل ایجاد محیط مناسب برای رشد مخمرها و در نتیجه ایجاد سمومی که موجب تحریک موضع می گردند، باید اجتناب گردد.

موارد منع مصرف:

وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو یا داروهای مشابه.

هشدارها:

• بهبود با این دارو معمولاً در هفته اول درمان با تسکین خارش صورت می گیرد. چنانچه پس از ۴ هفته از مصرف دارو بهبودی حاصل نشد، به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه B، مصرف این دارو در سه ماهه اول بارداری و در دوران شیردهی ممنوع است و در صورت نیاز به مصرف باید منافع دارو به مضار آن در نظر گرفته شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی میزان و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

• مقدار کافی محلول را روزانه دو بار، صبح و عصر روی موضع مورد نظر بمالید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید.

• راش پوستی، کهیر، تاول، سوزش، خارش، قرمزی و پوسته پوسته شدن پوست، احساس گزش، التهاب یا دیگر علائم تحریکات پوستی که قبل از شروع درمان وجود نداشته است.

شرایط نگهداری دارو:

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

یک عدد ظرف ۲۰ میلی لیتری به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی.

صدای مشتری: ۰۲۱-۲۴ ۲۳۲
www.parsdarou.ir
Reference: USP DI 2007

ساخت (پارس دارو) تهران - ایران



=



4485U
PANTONE

165mm