

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید :

عوارض شایع تر :

• آنوزینوفیلی (مدفوع تیره یا سیاه ، درد قفسه سینه ، لرز ، سرفه ، تب ، ادرار دردناک ، کوتاهی تنفس ، گلودرد ، ایجاد زخم یا نقاط سفید رنگ روی زبان یا داخل دهان و غدد بزاقی ، خونریزی غیر طبیعی ، کبودی ، خستگی یا ضعف غیرعادی) .

عوارض با شیوع کمتر :

• واکنش های حساسیتی (تب ، خارش پوست ، راش یا قرمزی ، تورم) ، کبودی یا خونریزی های غیرعادی ، کولیت سودوممبران (درد های شکمی ، اسهال آبکی یا خونی ، تب) ، ترومبوفلیت (درد ، قرمزی و تورم در محل تزریق) ، پوسته پوسته شدن ، خارش ، قرمزی و راش پوستی .

شرایط نگهداری:

- دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

بسته بندی :

- کپسول ۲۵۰ میلی گرم : ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی
- کپسول ۵۰۰ میلی گرم : ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی ۱۲۵ میلی گرم / ۵ میلی لیتر : یک شیشه ۱۰۰ میلی لیتری به همراه پیمانه و برگه راهنما داخل جعبه مقوایی
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی ۲۵۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر : یک شیشه ۱۰۰ میلی لیتری به همراه پیمانه و برگه راهنما داخل جعبه مقوایی

ساخت (پارس دارو) :
تهران - ایران



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳
www.parsdaru.ir

سفالکسین

پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر
کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

دسته دارویی:

ضد باکتری

موارد مصرف دارو:

عفونت مفاصل و استخوان ها ، عفونت دستگاه ادراری تناسلی ، اوتیت میانی ، فارنژیت ، عفونت بافت های نرم و پوست ، مجاری ادرار

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید .
- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقادیر تجویز شده تجاوز نکنید .
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو ، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است ، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید .
- دوره درمان را کامل کنید .
- در صورتی که علائم بهبودی طی چند روز اول درمان حاصل نشد ، با پزشک خود تماس بگیرید .

موارد منع مصرف:

سابقه هرگونه واکنش غیر عادی یا حساسیتی نسبت به این دارو و انواع سفالوسپورین ها ، پنی سیلین و مشتقات آن ، پنی سیلامین و مواد دیگر از قبیل غذاها ، مواد محافظ و رنگ ها .

مصرف در بارداری و شیردهی:

گروه B ، مصرف این دارو در دوران بارداری باید تحت نظر پزشک انجام گیرد .

این دارو در شیر مادر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک صورت گیرد .

احتیاطات:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :

- اختلالات انعقادی ، بیماری های سیستم گوارش ، اختلالات کلیوی .

تداخلات دارویی:

- آمینوگلیکوزیدها ، دیورتیک ها ، پروبنسید

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک برحسب سن بیمار و نوع بیماری تعیین می کند .

سفالکسین

پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر
کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

دسته دارویی:

ضد باکتری

موارد مصرف دارو:

عفونت مفاصل و استخوان ها ، عفونت دستگاه ادراری تناسلی ، اوتیت میانی ، فارنژیت ،

عفونت بافت های نرم و پوست ، مجاری ادرار

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نماید .
- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مقادیر تجویز شده تجاوز نکنید .
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو ، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است ، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید .
- دوره درمان را کامل کنید .
- در صورتی که علائم بهبودی طی چند روز اول درمان حاصل نشد ، با پزشک خود تماس بگیرید .

موارد منع مصرف:

سابقه هرگونه واکنش غیر عادی یا حساسیتی نسبت به این دارو و انواع سفالوسپورین ها ،
پنی سیلین و مشتقات آن ، پنی سیلامین و مواد دیگر از قبیل غذاها ، مواد محافظ و رنگ ها .

مصرف در بارداری و شیردهی:

گروه B ، مصرف این دارو در دوران بارداری باید تحت نظر پزشک انجام گیرد .

این دارو در شیر مادر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک صورت گیرد .

احتیاطات:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :

- اختلالات انعقادی ، بیماری های سیستم گوارش ، اختلالات کلیوی .

تداخلات دارویی:

- آمینوگلیکوزیدها ، دیورتیک ها ، پروبنسید

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک برحسب سن بیمار و نوع بیماری تعیین می کند .

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز

بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، ولی در صورت بروز هر یک از

عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید :

عوارض شایع تر :

- آنوزینوفیلی (مدفوع تیره یا سیاه ، درد قفسه سینه ، لرز ، سرفه ، تب ، ادرار دردناک ، کوتاهی تنفس ، گلودرد ، ایجاد زخم یا نقاط سفید رنگ روی زبان یا داخل دهان و غدد بزاقی ، خونریزی غیر طبیعی ، کبودی ، خستگی یا ضعف غیرعادی) .

عوارض با شیوع کمتر :

- واکنش های حساسیتی (تب ، خارش پوست ، راش یا قرمزی ، تورم) ، کبودی یا خونریزی های غیرعادی ، کولیت سودوممبران (درد های شکمی ، اسهال آبکی یا خونی ، تب) ، ترموبوفلیت (درد ، قرمزی و تورم در محل تزریق) ، پوسته پوسته شدن ، خارش ، قرمزی و راش پوستی .

شرایط نگهداری:

- دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نماید .

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نماید .

بسته بندی :

- کپسول ۲۵۰ میلی گرم : ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی
- کپسول ۵۰۰ میلی گرم : ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی ۱۲۵ میلی گرم / ۵ میلی لیتر : یک شیشه ۱۰۰ میلی لیتری به همراه پیمانه و برگه راهنما داخل جعبه مقوایی
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی ۲۵۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر : یک شیشه ۱۰۰ میلی لیتری به همراه پیمانه و برگه راهنما داخل جعبه مقوایی

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳
www.parsdarou.ir

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران



5005U
PANTONE



Black