



ساخت: «پارس دارو»
تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳
www.parsdaru.ir

●● عوارضی که بیشتر احتمال بروز دارند:

ادم (تورم صورت، دستها و پاها)، راش پوستی، اختلالات دستگاه تنفسی (سرفه، گلودرد و تب)

●● عوارض زیر به ندرت اتفاق می افتد:

برونشیت، آهسته شدن ریتم تنفسی، گاستریت (سوزش معده و سینه)، دردهای شدید شکمی همراه با ضعف، اسهال و کاهش اشتها، خونریزی یا زخم معده (مدفوع تیره یا خونی، استفراغ خونی) علائم مشابه آنفلوآنزا، تاکی کاردی، افزایش غیر طبیعی وزن.

● عوارض زیر نیاز به اقدام اورژانسی خاصی ندارند مگر آنکه طولانی بوده یا آزار دهنده باشند، که در آن صورت پزشک خود را مطلع سازید:

درد پشت، اسهال، سرگیجه، سردرد، کم خوابی، گلودرد، سینوزیت، درد و نفخ شکم، کاهش اشتها، دردهای مفاصل، ضعف، افسردگی، خشکی دهان، خستگی شدید، تب، گرگرفتگی و تعریق.

عوارض مصرف بیش از حد دارو:

● در صورت مصرف بیش از حد دارو عوارض زیر معمولاً اتفاق می افتد، البته این عوارض الزاماً در همه افراد مشاهده نمی شود:

● نارسایی شدید کلیه (سفتی عضلات سینه و اختلال در تنفس، کاهش ناگهانی ادرار، تورم صورت، دستها و پاها، تشنگی و خستگی غیرطبیعی همراه با ضعف، افزایش وزن).

● دردهای شدید شکمی

● خونریزی شدید معده (مدفوع خونی، استفراغ خونی).

● افزایش فشارخون (سرگیجه، سردردهای شدید و مداوم).

● خواب آلودگی

● برای درمان عوارض مصرف بیش از حد دارو بیمار را بلافاصله به مراکز اورژانسی منتقل نمائید، اقدامات زیر معمولاً انجام می پذیرد:

● برای کاهش جذب دارو تجویز زغال فعال یا ایجاد استفراغ صورت می گیرد.

نکات قابل توصیه :

● دارو را دقیقاً مطابق تجویز پزشک مصرف نمائید.

● در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، بلافاصله آن را مصرف نمائید مگر آنکه مدت زمان کوتاهی به نوبت بعدی باقی مانده باشد، که در آن صورت نیازی به مصرف دوز فراموش شده نبوده و مصرف سایر نوبتها را طبق فواصل تنظیم شده ادامه دهید، از دوباربر کردن میزان مصرف دارو خودداری نمائید.

● در صورت درمان طولانی مدت دارو، مراجعات منظم به پزشک ضروری می باشد.

● در صورت درمان با این دارو بهتر است از مصرف الکل اجتناب ورزید.

● در طول درمان با این دارو از مصرف سایر مسکنهای این دسته اجتناب ورزید، مگر آنکه پزشک معالج توصیه دیگری داشته باشد.

● در صورت بروز هر یک از علائم ادم و خونریزی معده، افزایش وزن غیرعادی و راش پوستی و یا علائم مربوط به سمیت کبدی از جمله تب، خستگی و خارش پوست، درد شکم و تهوع پزشک خود را بلافاصله مطلع سازید.

● در طول درمان با این دارو ممکن است اختلالات زیر در آزمایشات بالینی ایجاد شود:

● افزایش میزان آنزیمهای کبدی.

● افزایش میزان نیتروژن اوره و کلرید خون.

● کاهش میزان فسفات خون.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

● میزان مصرف این دارو برحسب سن و نوع بیماری شما توسط پزشک معالج تعیین میگردد، ولی بهترین روش مصرف این دارو به شرح ذیل می باشد:

● در درمان آرتریت روماتوئید: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم دویار در روز.

● در درمان استئوآرتریت: روزانه ۲۰۰ میلی گرم بصورت تک دوز یا ۱۰۰ میلی گرم دویار در روز.

نحوه نگهداری دارو:

● دارو را درون جعبه، دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید.

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

سلکوکسیب

کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

مطالب لازم برای بیمار:

این دارو برای درمان بیماری‌های شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.

موارد مصرف دارو:

آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

● دارا بودن هرگونه واکنش حساسیتی نسبت به این دارو و سایر داروهای این دسته، آسپیرین، سولفونامید و ترکیبات مشابه.

● ابتلاء به آسم توأم با حساسیت به آسپیرین.

● بارداری و شیردهی.

● مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در اواخر آن توصیه نمی شود. این دارو در گروه C طبقه بندی FDA قرار میگیرد.

● ترشح این دارو در شیر مادر هنوز به اثبات نرسیده ولی با توجه به عوارض بالقوه این دارو بر نوزاد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

● اطلاعات مفیدی در مورد رابطه عوارض این دارو با سن بیمار در دسترس نمی باشد ولی به نظر می رسد که برخی از سالخوردهگان نسبت به بروز عوارض احتمالی دارو، حساس تر می باشند، لذا در این موارد حداقل دوز مؤثر دارو برای کوتاهترین دوره درمان توصیه می گردد. شواهدی بر منع مصرف این دارو در سالخوردهگان وجود ندارد.

● در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر، تداخلات آن با سلکوکسیب در نظر گرفته شود، اگر چه بروز تمام این تداخلات ممکن است در یک فرد دیده نشود.

● مصرف همزمان داروهای ضد فشار خون از دسته مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین با سلکوکسیب ممکن است موجب کاهش اثرات ضد فشار خونی آن گردد.

● داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیم که ممکن است موجب کاهش غلظت پلاسمایی سلکوکسیب گردند.

● در صورت مصرف همزمان با آسپیرین، کاهش میزان مصرف آسپیرین توصیه می گردد، در غیر این صورت خطرات بروز زخم ها و عوارض گوارشی تشدید می گردد.

● فوروزاماید و داروهای مدر تیازیدی

● مصرف روزانه فلوکونازول، موجب افزایش غلظت پلاسمایی سلکوکسیب می گردد.

● لینتیم

● وارفارین: سلکوکسیب تغییری در عملکرد این دارو ایجاد نمی کند، ولی با توجه به اینکه ریسک خونریزی را افزایش می دهد، بایستی میزان مصرف وارفارین تنظیم گردد.

موارد احتیاط:

● به جزء در موارد خاص، این دارو در بیماران زیر منع مصرف دارد:

● واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی و آنژیوادم وابسته به آسپیرین و داروهای مشابه.

● پولیپ بینی به همراه برونکواسپاسم وابسته به آسپیرین.

● مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط و یا در نظر گرفتن عوارض احتمالی آن صورت بگیرد.

● بیماران مشکوک به کاهش عملکرد آنزیم های کبدی.

● کم خونی

● آسم

● خونریزی های لوله گوارشی و ابتلاء به زخم معده

● بیماری هایی از قبیل نارسایی قلبی، نارسایی احتقانی قلب، ادم و فشار خون

● نارسایی کلیه و کبد

● انجام تستهای آزمایشگاهی زیر برای پیگیری عوارض جانبی، ممکن است با نظر پزشک معالج انجام پذیرد:

● تعیین مقدار آنزیم های مربوط به عملکرد کبد (SGPT,SGOT)

● تعیین مقدار هماتوکریٹ و هموگلوبین (به خصوص در بیمارانی که علائم عوارض خونی را بروز می دهند).

عوارض جانبی:

● هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:

•• عوارضی که بیشتر احتمال بروز دارند:

ادم (تورم صورت، دستها و پاها)، راش پوستی، اختلالات دستگاه تنفسی (سرفه، گلودرد و تب)

•• عوارض زیر به ندرت اتفاق می افتد:

برونشیت، آهسته شدن ریتم تنفسی، گاستریت (سوزش معده و سینه)، دردهای شدید شکمی همراه با ضعف، اسهال و کاهش اشتها، خونریزی یا زخم معده (مدفوع تیره یا خونی، استفراغ خونی) علائم مشابه آنفلوآنزا، تاکی کاردی، افزایش غیر طبیعی وزن.

• عوارض زیر نیاز به اقدام اورژانسی خاصی ندارند مگر آنکه طولانی بوده یا آزار دهنده باشند، که در آن صورت پزشک خود را مطلع سازید:

درد پشت، اسهال، سرگیجه، سردرد، کم خوابی، گلودرد، سینوزیت، درد و نفخ شکم، کاهش اشتها، دردهای مفاصل، ضعف، افسردگی، خشکی دهان، خستگی شدید، تب، گرگرفتگی و تعریق.

عوارض مصرف بیش از حد دارو:

• در صورت مصرف بیش از حد دارو عوارض زیر معمولاً اتفاق می افتد، البته این عوارض الزاماً در همه افراد مشاهده نمی شود:

•• نارسایی شدید کلیه (سفتی عضلات سینه و اختلال در تنفس، کاهش ناگهانی ادرار، تورم صورت، دستها و پاها، تشنگی و خستگی غیرطبیعی همراه با ضعف، افزایش وزن).

•• دردهای شدید شکمی

•• خونریزی شدید معده (مدفوع خونی، استفراغ خونی).

•• افزایش فشارخون (سرگیجه، سردردهای شدید و مداوم).

•• خواب آلودگی

• برای درمان عوارض مصرف بیش از حد دارو بیمار را بلافاصله به مراکز اورژانسی منتقل نمائید، اقدامات زیر معمولاً انجام می پذیرد:

•• برای کاهش جذب دارو تجویز زغال فعال یا ایجاد استفراغ صورت می گیرد.

نکات قابل توصیه :

• دارو را دقیقاً مطابق تجویز پزشک مصرف نمائید.

• در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، بلافاصله آن را مصرف نمائید مگر آنکه مدت زمان کوتاهی به نوبت بعدی باقی مانده باشد، که در آن صورت نیازی به مصرف دوز فراموش شده نبوده و مصرف سایر نوبتها را طبق فواصل تنظیم شده ادامه دهید، از دوباربر کردن میزان مصرف دارو خودداری نمائید.

• در صورت درمان طولانی مدت دارو، مراجعات منظم به پزشک ضروری می باشد.

• در صورت درمان با این دارو بهتر است از مصرف الکل اجتناب ورزید.

• در طول درمان با این دارو از مصرف سایر مسکنهای این دسته اجتناب ورزید، مگر آنکه پزشک معالج توصیه دیگری داشته باشد.

• در صورت بروز هر یک از علائم ادم و خونریزی معده، افزایش وزن غیرعادی و راش پوستی و یا علائم مربوط به سمیت کبدی از جمله تب، خستگی و خارش پوست، درد شکم و تهوع پزشک خود را بلافاصله مطلع سازید.

• در طول درمان با این دارو ممکن است اختلالات زیر در آزمایشات بالینی ایجاد شود:

•• افزایش میزان آنزیمهای کبدی.

•• افزایش میزان نیترژن اوره و کلرید خون.

•• کاهش میزان فسفات خون.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

• میزان مصرف این دارو برحسب سن و نوع بیماری شما توسط پزشک معالج تعیین میگردد، ولی بهترین روش مصرف این دارو به شرح ذیل می باشد:

• در درمان آرتریت روماتوئید: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم دویار در روز.

• در درمان استئوآرتریت: روزانه ۲۰۰ میلی گرم بصورت تک دوز یا ۱۰۰ میلی گرم دویار در روز.

نحوه نگهداری دارو:

• دارو را درون جعبه، دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

سلکوکسیب

کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

مطالب لازم برای بیمار :

این دارو برای درمان بیماری‌های فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.

موارد مصرف دارو:

آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

• دارا بودن هرگونه واکنش حساسیتی نسبت به این دارو و سایر داروهای این دسته، آسپیرین، سولفونامید و ترکیبات مشابه.

• ابتلاء به آسم توأم با حساسیت به آسپیرین.

• بارداری و شیردهی.

•• مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در اواخر آن توصیه نمی شود. این دارو در گروه C طبقه بندی FDA قرار میگیرد.

•• ترشح این دارو در شیر مادر هنوز به اثبات نرسیده ولی با توجه به عوارض بالقوه این دارو بر نوزاد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

• اطلاعات مفیدی در مورد رابطه عوارض این دارو با سن بیمار در دسترس نمی باشد ولی به نظر می رسد که برخی از سالخوردهان نسبت به بروز عوارض احتمالی دارو، حساس تر می باشند، لذا در این موارد حداقل دوز موثر دارو برای کوتاهترین دوره درمان توصیه می گردد. شواهدی بر منع مصرف این دارو در سالخوردهگان وجود ندارد.

• در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر، تداخلات آن با سلکوکسیب در نظر گرفته شود، اگر چه بروز تمام این تداخلات ممکن است در یک فرد دیده نشود.

•• مصرف همزمان داروهای ضد فشار خون از دسته مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین با سلکوکسیب ممکن است موجب کاهش اثرات ضد فشار خونی آن گردد.

•• داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیم و منیزیم که ممکن است موجب کاهش غلظت پلاسمایی سلکوکسیب گردند.

•• در صورت مصرف همزمان با آسپیرین، کاهش میزان مصرف آسپیرین توصیه می گردد، در غیر این صورت خطرات بروز زخم ها و عوارض گوارشی تشدید می گردد.

•• فوروزمایید و داروهای مدر تیازیدی

•• مصرف روزانه فلوکونازول، موجب افزایش غلظت پلاسمایی سلکوکسیب می گردد.

•• لینیم

•• وارفارین: سلکوکسیب تغییری در عملکرد این دارو ایجاد نمی کند، ولی با توجه به اینکه ریسک خونریزی را افزایش می دهد، بایستی میزان مصرف وارفارین تنظیم گردد.

موارد احتیاط :

• به جزء در موارد خاص، این دارو در بیماران زیر منع مصرف دارد:

• واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی و آنژیوادم وابسته به آسپیرین و داروهای مشابه.

• پولپ پیپی به همراه برونکواسپاسم وابسته به آسپیرین.

• مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط و یا در نظر گرفتن عوارض احتمالی آن صورت بگیرد.

• بیماران مشکوک به کاهش عملکرد آنزیم های کبدی.

• کم خونی

• آسم

• خونریزی های لوله گوارشی و ابتلاء به زخم معده

• بیماری هایی از قبیل نارسایی قلبی، نارسایی احتقانی قلب، ادم و فشار خون

• نارسایی کلیه و کبد

• انجام تستهای آزمایشگاهی زیر برای پیگیری عوارض جانبی، ممکن است با نظر پزشک معالج انجام پذیرد:

• تعیین مقدار آنزیم های مربوط به عملکرد کبد (SGPT,SGOT)

• تعیین مقدار هماتوکریت و هموگلوبین (به خصوص در بیمارانی که علائم عوارض خونی را بروز می دهند).

عوارض جانبی:

• هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:



=



Black



=



2583U

PANTONE

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳

www.parsdarou.ir

ساخت «پارس دارو»

تهران - ایران

