

کلوبتازول ۰/۰۵ درصد لوسیون موضعی

کلوبتازول ۰/۰۵٪ به صورت لوسیون موضعی در بسته بندی ۲۵ میلی لیتری در جعبه‌ی یک عددی همراه با بروشور توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

موارد مصرف دارو

• کلوبتازول از دسته دارویی کورتیکواستروئیدی می‌باشد که خواص ضد التهابی داشته و برطرف کننده قرمزی و التهابات پوستی می‌باشد. این دارو برای کاهش علائم و درمان بیماری‌های پوستی مانند پسوریازیس، لیکن پلاس و لوپوس به کار می‌رود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار

• این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
• دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید.
• فقط برای استعمال خارجی می‌باشد و از تماس دارو با چشم‌ها و اطراف آن خودداری نمایید.
• در صورت عدم بهبودی علائم در طول دو هفته و یا تشدید آنها، با پزشک خود مشورت نمایید.

موارد منع مصرف

• در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای دیگر این دارو
• این دارو برای درمان درماتیت پوشک تایید نشده است.
• مصرف این دارو برای نوزادان و کودکان کمتر از ۱۲ سال پیشنهاد نمی‌شود.

مصرف در بارداری و شیردهی

• در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص تجویز شود.

هشدارها

• مصرف این دارو به مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد برخی عوارض ناخواسته شود.
• از پوشاندن موضع تحت درمان با پانسمان و بانداز خودداری نمایید، مگر در صورتیکه پزشک توصیه کرده باشد.

احتیاطات

• به صورت یک لایه نازک روی موضع آسیب دیده مالیده شود و به آرامی ماساژ دهید.

- اگر در ناحیه تحت درمان، تحریک و یا خارش اتفاق افتاد، از ادامه مصرف این دارو خودداری نمایید.
- قبل و بعد از استفاده از لوسیون، دست‌های خود را بشوئید.
- پس از هر بار مصرف در ظرف را محکم ببندید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی

• در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:
متی‌راپون، دفراسیروکس

مقدار و نحوه مصرف دارو

• مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:
کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان :
• لایه نازکی از لوسیون را به صورت روزانه دو یا سه بار به موضع مالیده و به آرامی ماساژ دهید.

عوارض جانبی دارو

• هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

عوارض شایع: واکنشهای پوستی (مانند سوزش، درد، خارش)، علائم عفونت، نازک شدن پوست.

عوارض نادر: درماتیت، استریا، بثورات شبیه آکنه

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

شرایط نگهداری دارو

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید و از نگهداری در یخچال خودداری شود.

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳
www.parsdarou.ir



ساخت پارس دارو
تهران-ایران