



ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران

Reference:
USP DI 2007
Martindale 38

www.parsdarou.ir صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۲۷۳

● داروهای درمان میاستینی گراویس نظیر نئوستیگمین و پیرییدوستیگمین: کلیندامایسین باعث کاهش اثر درمانی این دسته از داروها می‌گردد.

● آنتی بیوتیک‌هایی چون ماکرولیدها، لینزولید، کلرامنیکل و استریتوگرامین: موجب کاهش اثر کلیندامایسین می‌گردند.

● ضد دردهای مخدر: خطر دپرسیون تنفسی این دسته از داروها، در صورت مصرف همزمان با کلیندامایسین افزایش می‌یابد.

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

● بزرگسالان: دوز مصرف روزانه کپسول کلیندامایسین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم (یک تا دو کپسول) هر ۶ ساعت و حداکثر دوز مصرفی آن ۱۸۰۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

● در بیماران با درجات شدید از نارسایی کبدی یا کلیوی: نیاز به تنظیم دوز دارو وجود دارد و باید با احتیاط مصرف شود.

● در صورت فراموش شدن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت را مصرف نمایید و در صورت رسیدن به زمان مصرف دوز بعدی، از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری نمایید.

● به منظور کاهش عوارض گوارشی بهتر است این دارو همراه با غذا و یا یک لیوان پر آب میل شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لذا در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض شایع:

● عوارض گوارشی همچون دردهای شدید شکمی، اسهال (در برخی موارد شدید، آبکی و همراه با خون) تب

عوارض نادر:

● واکنش حساسیتی به دارو با علائمی چون راش پوستی، قرمزی و خارش پوست

● نوتروپنی (کاهش سلول‌های ایمنی خون) با علائمی چون تب و گلودرد

● ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت خون) با علائمی چون خونریزی و کبودی

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه‌که در برگه راهنما ذکر شده، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

● دارو را در جایی خشک و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

● تا زمان مصرف، دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

● در دمای زیر ۴۰ درجه سانتی‌گراد (ترجیحاً بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود.

دالاکپ® ۱۵۰ و ۳۰۰

کلیندامایسین هیدروکلراید کپسول خوراکی

کلیندامایسین هیدروکلراید به‌صورت کپسول‌های خوراکی با دو دوز ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در پلیسترهای ۱۰ عددی وجعبه ۳۰ عددی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

کلیندامایسین داروی آنتی بیوتیک از دسته لینومایسین‌ها می‌باشد و در درمان عفونت‌های استافیلوکوک استخوان و مفصل، عفونت‌های لگنی در زنان (اندومتریتوزیس، آبسه لولم‌ای- تخمدانی و...)، عفونت‌های داخل شکمی، ریوی، گوش میانی، سینوزیت، آبسه‌های شدید دندان‌ی، عفونت‌های پوستی و... استفاده می‌شود.

راهنمای عمومی برای بیمار

● این دارو برای درمان بیماری شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

● دوره درمان خود را کامل کنید.

موارد منع مصرف

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به کلیندامایسین یا سایر لینومایسین‌ها با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی

● بارداری: زیان آور بودن این دارو در دوران بارداری شناخته نشده است. ولی با توجه به اینکه دارو می‌تواند از جفت عبور کند، باید زیر نظر پزشک مصرف شود.

● شیردهی: زیان آور بودن این دارو در دوران شیردهی شناخته نشده است. ولی با توجه به اینکه مقداری از دارو به داخل شیر ترشح می‌شود، باید زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها و احتیاطات

● اسهال یکی از عوارض رایج این دارو می‌باشد. در صورت بروز طولانی مدت و یا شدید اسهال، علائم التهاب روده و یا اسهال خونی در طول درمان با دارو، مصرف دارو را متوقف نمایید و به پزشک خود اطلاع دهید.

● در صورت نارسایی کبدی و یا کلیوی شدید، نیاز به تنظیم دوز دارو وجود دارد و باید با احتیاط مصرف شود. آزمایشات مربوط به عملکرد کبد و کلیه و همچنین تست مدفوع به صورت دورهای در مصارف طولانی مدت توصیه می‌گردد.

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

● از مصرف داروی تاریخ‌گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

● داروهای مسدود کننده عصب و عضله: کلیندامایسین باعث افزایش اثر این دسته از داروها می‌گردد و با علائمی چون ضعف عضلانی، دپرسیون تنفسی و یا آپنه‌های تنفسی همراه است.

● داروهای ضد اسهال جاذب نظیر بیسموت ساب سیترات: مصرف این دسته از داروها موجب کاهش سرعت جذب کلیندامایسین در صورت مصرف همزمان، می‌گردد فلذا توصیه می‌شود در صورت لزوم حداقل ۲ ساعت قبل و یا ۳-۴ ساعت پس از مصرف کلیندامایسین، مصرف شوند.

165mm

165mm

دالاکپ® ۱۵۰ و ۳۰۰

کلیندامایسین هیدروکلراید کپسول خوراکی

کلیندامایسین هیدروکلراید به صورت کپسول‌های خوراکی با دو دوز ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در پلیسترهای ۱۰ عددی وجعبه ۳۰ عددی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

کلیندامایسین داروی آنتی بیوتیک از دسته لینومایسین‌ها می‌باشد و در درمان عفونت‌های استافیلوکوک استخوان و مفصل، عفونت‌های لگنی در زنان (اندومتریتوزیس، آپسه لولمائی- تخمدانی و...)، عفونت‌های داخل شکمی، ریوی، گوش میانی، سینوزیت، آپسه‌های شدید دندانی، عفونت‌های پوستی و... استفاده می‌شود.

راهنمای عمومی برای بیمار

- این دارو برای درمان بیماری شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
- دوره درمان خود را کامل کنید.

موارد منع مصرف

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به کلیندامایسین یا سایر لینومایسین‌ها با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی

- بارداری:** زنان آور بودن این دارو در دوران بارداری شناخته نشده است. ولی با توجه به اینکه دارو می‌تواند از جفت عبور کند، باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
- شیردهی:** زنان آور بودن این دارو در دوران شیردهی شناخته نشده است. ولی با توجه به اینکه مقداری از دارو به داخل شیر ترشح می‌شود، باید زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها و احتیاطات

- اسهال یکی از عوارض رایج این دارو می‌باشد. در صورت بروز طولانی مدت و یا شدید اسهال، علائم التهاب روده و یا اسهال خونی در طول درمان با دارو، مصرف دارو را متوقف نمایید و به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت نارسایی کبدی و یا کلیوی شدید، نیاز به تنظیم دوز دارو وجود دارد و باید با احتیاط مصرف شود. آزمایشات مربوط به عملکرد کبد و کلیه و همچنین تست مدفوع به صورت دورهای در مصارف طولانی مدت توصیه می‌گردد.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی

- در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:
- داروهای مسدود کننده عصب و عضله: کلیندامایسین باعث افزایش اثر این دسته از داروها می‌گردد و با علائمی چون ضعف عضلانی، دپرسیون تنفسی و یا آپنه‌های تنفسی همراه است.
- داروهای ضد اسهال جاذب نظیر بیسموت ساب سیترا: مصرف این دسته از داروها موجب کاهش سرعت جذب کلیندامایسین در صورت مصرف همزمان، می‌گردد فلذا توصیه می‌شود در صورت لزوم حداقل ۲ ساعت قبل و یا ۳-۴ ساعت پس از مصرف کلیندامایسین، مصرف شوند.

- داروهای درمان میاستینی گراویس نظیر نئوستیگمین و پیریروستیگمین: کلیندامایسین باعث کاهش اثر درمانی این دسته از داروها می‌گردد.
- آنتی بیوتیک‌هایی چون ماکرولیدها، لینزولید، کلرامفنیکل و استریتوگرامین: موجب کاهش اثر کلیندامایسین می‌گردند.
- ضد دردهای مخدر: خطر دپرسیون تنفسی این دسته از داروها، در صورت مصرف همزمان با کلیندامایسین افزایش می‌یابد.

مقدار و نحوه مصرف دارو

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:
- بزرگسالان: دوز مصرف روزانه کپسول کلیندامایسین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم (یک تا دو کپسول) هر ۶ ساعت و حداکثر دوز مصرفی آن ۱۸۰۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
- در بیماران با درجات شدید از نارسایی کبدی یا کلیوی: نیاز به تنظیم دوز دارو وجود دارد و باید با احتیاط مصرف شود.

- در صورت فراموش شدن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت را مصرف نمایید و در صورت رسیدن به زمان مصرف دوز بعدی، از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری نمایید.
- به منظور کاهش عوارض گوارشی بهتر است این دارو همراه با غذا و یا یک لیوان پر آب میل شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لذا در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض شایع :

- عوارض گوارشی همچون دردهای شدید شکمی، اسهال (در برخی موارد شدید، آبکی و همراه با خون) تب
- عوارض نادر :

- واکنش حساسیتی به دارو با علائمی چون راش پوستی، قرمزی و خارش پوست
- نوتروپنی (کاهش سلول‌های ایمنی خون) با علائمی چون تب و گلودرد
- ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت خون) با علائمی چون خونریزی و کبودی
- در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

- دارو را در جایی خشک و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- تا زمان مصرف، دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.
- در دمای زیر ۴۰ درجه سانتی‌گراد (ترجیحاً بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود.

Reference:
USP DI 2007
Martindale 38
www.parsdarou.ir صدای مشتری: ۰۲۱-۲۴۴۷۲۲

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران



=

=



Black

Pantone 273U

90mm

90mm