

دالاواگ

(کلیندامایسین) کرم واژینال ۲٪

مطالب لازم برای بیمار :

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید .

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :

• وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و مواد دیگر اعم از دارویی و غذایی .

• بارداری یا شیردهی .

• مصرف این دارو در اطفال و سالمندان .

• مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر .

• داشتن بیماریهای دیگر نظیر ناراحتی معده یا روده .

توجه :

• اگر بعد از چند روز مصرف این دارو علایم بیماری بهبود نیافت و یا بدتر شد با پزشک خود مشورت کنید .

• این دارو ممکن است در بعضی افراد خواب آلودگی ایجاد نماید لذا هنگام انجام کارهای دقیق ، احتیاط نمائید .

• در ضمن مصرف این دارو از پنبه یا نوار بهداشتی و شورت نخی استفاده کنید .


• مصرف این دارو را طبق نظر پزشک تا پایان دوره درمان ادامه دهید (حتی در دوره قاعدگی) .

• طی مصرف این دارو از مقاربت اجتناب ورزیده و تا ۳ روز بعد از قطع مصرف دارو نباید از وسایل جلوگیری لاسیتیکی مثل کاندوم استفاده کرد .

• دستها را قبل و بعد از استعمال این دارو بشویند و از تماس دارو با چشم جلوگیری نمائید .

چگونگی استفاده از اپلیکاتور :

• تیوب کرم را از جعبه خارج نموده و به کمک درب پلاستیکی کرم ، پوشش آلومینیومی تیوب را سوراخ نمائید .



• سر تیوب کرم را به قسمت ۲ (مطابق شکل) با کمی فشار متصل کنید . با یک دست اپلیکاتور را نگهداشته و با دست دیگر تیوب کرم را فشار دهید تا لوله اپلیکاتور پر از کرم شده و میله آن تا انتها به عقب برگردد .



• بهتر است به پشت خوابیده و اپلیکاتور پر از کرم را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو برده و سپس قسمت ۱ (مطابق شکل) را فشار داده تا کرم در عمق واژن تخلیه گردد .

مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو را برای هر بیمار پزشک معین میکند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو یک اپلیکاتور پر از کرم هر شب موقع خواب بمدت ۳ تا ۷ روز می باشد .

در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو ، هر چه زودتر آنرا استفاده نمائید مگر آنکه نوبت مصرف بعدی دارو فرا رسیده باشد در این صورت از نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و نوبت مصرف بعدی را نیز دورا بر نکشید .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

احساس خارش در واژن یا نواحی تناسلی ، وجود درد ضمن مقاربت ، ترشحات غیر طبیعی واژن ، اسهال ، سردرد، گیجی ، تهوع یا استفراغ ، درد یا پیچش معده .

شرایط نگهداری دارو:

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.



دالاواگ

(کلیندامایسین) کرم واژینال ۲٪

مطالب لازم برای بیمار :

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید .

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :

• وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و مواد دیگر اعم از دارویی و غذایی .

• بارداری یا شیردهی .

• مصرف این دارو در اطفال و سالمندان .

• مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر .

• داشتن بیماریهای دیگر نظیر ناراحتی معده یا روده .

توجه :

• اگر بعد از چند روز مصرف این دارو علایم بیماری بهبود نیافت و یا بدتر شد با پزشک خود مشورت کنید .

• این دارو ممکن است در بعضی افراد خواب آلودگی ایجاد نماید لذا هنگام انجام کارهای دقیق ، احتیاط نمائید .

• در ضمن مصرف این دارو از پنبه یا نوار بهداشتی و شورت نخی استفاده کنید .

• مصرف این دارو را طبق نظر پزشک تا پایان دوره درمان ادامه دهید (حتی در دوره قاعدگی) .

• طی مصرف این دارو از مقاربت اجتناب ورزیده و تا ۳ روز بعد از قطع مصرف دارو نباید از وسایل جلوگیری لاسیتیکی مثل کاندوم استفاده کرد .

• دستها را قبل و بعد از استعمال این دارو بشوئید و از تماس دارو با چشم جلوگیری نمائید .

چگونگی استفاده از اپلیکاتور :

• تیوب کرم را از جعبه خارج نموده و به کمک درب پلاستیکی کرم ، پوشش آلومینیومی تیوب را سوراخ نمائید .



• سر تیوب کرم را به قسمت ۲ (مطابق شکل) با کمی فشار متصل کنید . با یک دست اپلیکاتور را نگهداشته و با دست دیگر تیوب کرم را فشار دهید تا لوله اپلیکاتور پر از کرم شده و میله آن تا انتها به عقب برگردد .



• بهتر است به پشت خوابیده و اپلیکاتور پر از کرم را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو برده و سپس قسمت ۱ (مطابق شکل) را فشار داده تا کرم در عمق واژن تخلیه گردد .

مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو را برای هر بیمار پزشک معین میکند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو یک اپلیکاتور پر از کرم هر شب موقع خواب بمدت ۳ تا ۷ روز می باشد .

در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو ، هر چه زودتر آنرا استفاده نمائید مگر آنکه نوبت مصرف بعدی دارو فرا رسیده باشد در این صورت از نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و نوبت مصرف بعدی را نیز دورا بر نکشید .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

احساس خارش در واژن یا نواحی تناسلی ، وجود درد ضمن مقاربت ، ترشحات غیر طبیعی واژن ، اسهال ، سردرد، گیجی ، تهوع یا استفراغ ، درد یا پیچش معده .

شرایط نگهداری دارو:

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید .

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید .

