

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- این دارو را مطابق شیوه‌ای که پزشکتان دستور داده استفاده فرمایید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:
- برای جلوگیری از احساس طعم تلخ قرص، با بستنی قرص به طور کامل بلعیده شود.

مردان بزرگسال (سن ۱۸ تا ۶۴ سال):

توصیه می‌شود دوز شروع برای تمام بیماران ۳۰ میلی گرم باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و با تجویز پزشک می‌توان مقدار مصرف را به ۶۰ میلی گرم افزایش داد.

داکسوپیل® برای استفاده مستمر روزانه در نظر گرفته نشده است. باید تنها در هنگامی که قصد فعالیت جنسی وجود دارد، مصرف شود.

۱ تا ۳ ساعت قبل از فعالیت جنسی داکسوپیل® با بستنی مصرف گردد.

داکسوپیل® نباید بیش از یکبار در هر ۲۴ ساعت مصرف شود.

سالندان (افراد ۶۵ سال به بالا):

اثر بخشی و ایمنی داکسوپیل® در بیماران بالای ۶۵ سال ثابت نشده است.

بیماران با نارسایی کلیوی:

احتیاط در بیماران مبتلا به نارسایی خفیف یا متوسط کلیه توصیه می‌شود. داکسوپیل® برای استفاده در بیماران با نارسایی شدید کلیوی توصیه نمی‌شود.

بیماران مبتلا به نارسایی کبدی:

مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی شدید و متوسط منع میشود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت مشاهده عوارض زیر، دارو را قطع و فوراً به پزشک خود مراجعه نمایید:

- در صورت احساس ضعف شدید، سرگیجه یا منگی بلافاصله دراز کشیده به نحوی که سرتان پایین تر از بقیه بدنتان باشد. یا به گونه ای بنشینید که سرتان بین زانوهایتان قرار گیرد تا علامت رفع شوند، در این صورت از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

نکات:

- این دارو حداقل با یک لیوان آب مصرف شود.

عوارض جانبی:

- احساس سرگیجه، سردرد
- احساس تحریک پذیری، دلواپسی، بی قراری، احساس گرختن(بی حسی)، تعرق غیر طبیعی یا گر گرفتگی، اسهال، بیوست یا نفخ زیاد، درد معده، نفخ، مشکل خوابیدن یا کابوس های شبانه، خمیازه کشیدن، احتقان بینی (گرفتگی بینی)، افزایش فشارخون، مشکل در تمرکز، لرزش، زنگ در گوش، تاری دید، سوء هاضمه، خشکی دهان. احتمال اختلال در تعوظ و کاهش میل جنسی.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای زیر ۲۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی نگهداری فرمایید.

ساخت (پارس دارو)تهران - ایران
صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۲
www.parsdarou.ir

برگه راهنمای دارو

قرص روکش دار داکسوپیل® (داپوکستین ۳۰ و ۶۰ میلی گرم)

Daxopil®
داپوکستین ۳۰ و ۶۰ میلی گرم

اثرات درمانی:

داکسوپیل® جهت درمان انزال زودرس در مردان با سن ۱۸ تا ۶۴ سال استفاده می‌شود.

موارد مصرف دارو:

داکسوپیل® زمان انزال را افزایش داده و کنترل بر انزال را بهبود می‌بخشد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.
- می‌تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود.
- این دارو در کودکان و بزرگسالان زیر ۱۸ سال استفاده نمی‌شود.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت شدید به دارو یا اجزاء جانبی بکار رفته، در صورت وجود مشکلات قلبی از قبیل نارسایی قلبی یا مشکلاتی با ضربان قلب، سابقه غش، سابقه مانییا یا افسردگی شدید، مشکلات متوسط یا شدید کبدی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو برای زنان استفاده نمی‌شود.

هشدارها:

اگر هر یک از موارد زیر در شما دیده می‌شود، قبل از مصرف داکسوپیل® با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود مشکلات جنسی دیگری از قبیل اختلال نعوظ
- وجود سابقه سرگیجه ناشی از فشار خون پایین
- مصرف داروهای از قبیل اکستازی، متیل دی اکسی متا فمتامین، اسید لا پرزیک دی اتیل آمید، نازکونیک ها، بنزودiazepin ها
- مصرف الکل
- بیماری صرع
- سابقه خونریزی یا مشکلات لخته شدن خون
- مشکلات کلیوی
- ابتلا به فشار بالای چشم (گلوکوم) یا در معرض خطر ابتلا به آن
- بیماران با مشکلات نادر اثری عدم تحمل گالاتوز، کمبود لاکتاز یا بلاندی یا سوء جذب گلوکز – گالاتوز

تداخلات دارویی:

از آنجایی که مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می‌باشد، لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

- داروهای افسردگی با نام " مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOI ها)، تیوریدازین، لیتیموم، لیتروئید، تربیتوفان، مخمر سنت جان، ترامادول، داروهای ضد میگرن.

- به طور همزمان از مصرف داروهای فوق با داکسوپیل® خودداری نمایید. در صورت استفاده هر یک از داروهای بالا، لازم است ۱۴ روز پس از قطع مصرف این دسته داروها صبر کنید، سپس درمان با داکسوپیل® را آغاز نمایید. در صورت قطع مصرف داکسوپیل®، لازم است ۷ روز صبر نمایید، سپس هر یک از داروهای بالا را مصرف نمایید.
- داروهای اصلی برای عفونت قارچی، از جمله کتوکونازول و اینتراکونازول، فلوکونازول
- داروهای خاص برای آج آی وی، از جمله ریتوناویر، ساکوییناویر، نلفیناویر و آتاناویر
- آنتی بیوتیک های خاص برای درمان عفونت، از جمله تلیترومایسین، اریترومایسین و کلاریترومایسین
- نفازودون
- الکل
- داروهای غیر استروئیدی – ضد التهابی از قبیل ایبuprofen و استیل سالیسیلیک اسید
- داروهای رفیق کننده خون از جمله وارفارین
- دیگر داروهای خاص HIV، از قبیل امپرتاویر و فوسام پرتاویر
- آپریتانات جهت درمان حالت تهوع

در صورتی که دارویی غیر از بالا استفاده می‌کنید به پزشک خود اطلاع دهید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- این دارو را مطابق شیوه‌ای که پزشکتان دستور داده استفاده فرمایید . مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:
- برای جلوگیری از احساس طعم تلخ قرص، با یبستی قرص به طور کامل بلعیده شود.

مردان بزرگسال (سن ۱۸ تا ۶۴ سال):

توصیه می شود دوز شروع برای تمام بیماران ۳۰ میلی گرم باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و با تجویز پزشک می توان مقدار مصرف را به ۶۰ میلی گرم افزایش داد.

داکسوپیل® برای استفاده مستمر روزانه در نظر گرفته نشده است. باید تنها در هنگامی که قصد فعالیت جنسی وجود دارد. مصرف شود.

۱ تا ۳ ساعت قبل از فعالیت جنسی داکسوپیل® با یبستی مصرف گردد.

داکسوپیل® نباید بیش از یکبار در هر ۲۴ ساعت مصرف شود.

سالنندان (افراد ۶۵ سال به بالا):

اثر بخشی و ایمنی داکسوپیل® در بیماران بالای ۶۵ سال ثابت نشده است.

بیماران با نارسایی کلیوی:

احتیاط در بیماران مبتلا به نارسایی خفیف یا متوسط کلیه توصیه می شود. داکسوپیل® برای استفاده در بیماران با نارسایی شدید کلیوی توصیه نمی شود.

بیماران مبتلا به نارسایی کبدی:

مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی شدید و متوسط منع میشود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت مشاهده عوارض زیر، دارو را قطع و فوراً به پزشک خود مراجعه نمایید:

- در صورت احساس ضعف شدید، سرگیجه یا منگی بلافاصله دراز کشیده به نحوی که سرتان پایین تر از بقیه بدنتان باشد. یا به گونه ای بنشینید که سرتان بین زانوهایتان قرار گیرد تا علامت رفع شوند، در این صورت از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند. خودداری نمایید.

نکات:

- این دارو حداقل با یک لیوان آب مصرف شود.

عوارض جانبی:

- احساس سرگیجه. سردرد
- احساس تحریک پذیری، دلواپسی، بی قراری، احساس گرختن(بی حسی)، تعرق غیر طبیعی یا گر گرفتگی، اسهال، بیوست یا نفخ زیاد، درد معده، نفخ، مشکل خوابیدن یا کابوس های شبانه، خمیازه کشیدن، احتقان بینی (گرفتگی بینی)، افزایش فشارخون، مشکل در تمرکز، لرزش، زنگ در گوش، تاری دید، سوء هاضمه، خشکی دهان. احتمال اختلال در تعوظ و کاهش میل جنسی.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای زیر ۲۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی نگهداری فرمایید.

Daxopil®
دایوکسپیل ۳۰ و ۶۰ میلی گرم

برگه راهنمای دارو

قرص روکش دار داکسوپیل® (دایوکستین ۳۰ و ۶۰ میلی گرم)

اثرات درمانی:

داکسوپیل® جهت درمان انزال زودرس در مردان با سن ۱۸ تا ۶۴ سال استفاده می شود.

موارد مصرف دارو:

داکسوپیل® زمان انزال را افزایش داده و کنترل بر انزال را بهبود می بخشد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.
- می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود.
- این دارو در کودکان و بزرگسالان زیر ۱۸ سال استفاده نمی شود.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت شدید به دارو یا اجزاء جانبی بکار رفته، در صورت وجود مشکلات قلبی از قبیل نارسایی قلبی یا مشکلاتی با ضربان قلب، سابقه شش، سابقه مانییا یا افسردگی شدید، مشکلات متوسط یا شدید کبدی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو برای زنان استفاده نمی شود.

هشدارها:

اگر هر یک از موارد زیر در شما دیده می شود، قبل از مصرف داکسوپیل® با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود مشکلات جنسی دیگری از قبیل اختلال نعوظ
- وجود سابقه سرگیجه ناشی از فشار خون پایین
- مصرف داروهای از قبیل اکستازی، متیل دی اکسی متا مفتامین، اسید لا پرزریک دی اتیل آمید، نازکونیک ها، بنزودiazین ها
- مصرف الکل
- بیماری صرع
- سابقه خونریزی یا مشکلات لخته شدن خون
- مشکلات کلیوی
- ابتلا به فشار بالای چشم (گلوکوم) یا در معرض خطر ابتلا به آن
- بیماران با مشکلات نادر اثری عدم تحمل گالاکتوز، کمبود لاکتاز یا بلاندی یا سوء جذب گلوکز – گالاکتوز

تداخلات دارویی:

از آنجایی که مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می باشد، لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

- داروهای افسردگی با نام " مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOI ها)، تیوریدازین، لیتیم، لیتروئید، تریپتوفان، مخمر سنت جان، ترامادول، داروهای ضد میگرن.

- به طور همزمان از مصرف داروهای فوق با داکسوپیل® خودداری نمایید. در صورت استفاده هر یک از داروهای بالا، لازم است ۱۴ روز پس از قطع مصرف این دسته داروها صبر کنید، سپس درمان با داکسوپیل® را آغاز نمایید. در صورت قطع مصرف داکسوپیل®، لازم است ۷ روز صبر نمایید، سپس هر یک از داروهای بالا را مصرف نمایید.

- داروهای اصلی برای عفونت قارچی، از جمله کتوکونازول و اینتراکونازول، فلوکونازول
- داروهای خاص برای آچ آی وی، از جمله ریتوناویر، ساکوییناویر، نلفیناویر و آتازاناویر
- آنتی بیوتیک های خاص برای درمان عفونت، از جمله تلیترومایسین، اریترومایسین و کلاریترومایسین
- نفازودون
- الکل

- داروهای غیر استروئیدی – ضد التهابی از قبیل ایبuprofen و استیل سالیسیلیک اسید

- داروهای رفیق کننده خون از جمله وارفارین

- دیگر داروهای خاص HIV، از قبیل امپرتاویر و فوسام پرتاویر

- آپریتانات جهت درمان حالت تهوع

در صورتی که دارویی غیر از موارد بالا استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.



ساخت (پارس دارو) در
تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۲
www.parsdarou.ir