

دیلتیانو® ۲٪

دیلتیازم

دیلتیازم با نام تجاری دیلتیانو به صورت ژل موضعی با دوز ۲٪ در بسته بندی ۳۰ گرمی در جعبه یک عددی توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

موارد مصرف دارو

- ژل موضعی دیلتیانو به عنوان مهار کننده غیر دی هیدروپیپیدینی کانال کلسیمی، جهت درمان شقاق مقعد استفاده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- فقط برای استعمال خارجی است.

موارد منع مصرف

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای دیگر این دارو
- در صورت وجود سندروم سینوس بیمار، بلاک دهلیزی بطنی درجه ۲ یا ۳، فشار خون پایین، سکت قلبی حاد، احتقان ریوی

مصرف در بارداری و شیردهی

- در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص تجویز شود.

هشدارها

- این دارو فقط برای مصرف خارجی می‌باشد، لذا از مصرف خوراکی آن خودداری نمایید.
- از تماس این فرآورده با چشم‌ها و سطوح مخاطی خودداری نمایید.
- از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده خودداری کنید.

احتیاطات

- در صورت داشتن هرگونه بیماری قلبی و عروقی، پورفیری، بیماری کبدی و کلیوی و استفاده از داروهای بیهوشی، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.
- پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- دارو پس از باز شدن در صورت نگهداری در یخچال (دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد) تا ۴ هفته قابل مصرف می‌باشد.

165 mm

تداخلات دارویی

- تداخل دارویی خاصی برای این دارو به دست نیامده است ولی با توجه به جذب مقداری از دارو، موارد تداخل دارویی شکل خوراکی دارو، برای شکل موضعی نیز ذکر می‌گردد، لذا در صورت استفاده از داروهای زیر حتما پزشک خود را مطلع سازید: کاربامازپین، کینیدین، میدازولام، تریازولام، لوواسانتین، سایمتیدین، دیگوکسین، سیکلوسپورین، بتا بلاکرها مانند آنتولول و پروپرانولول، آلدسلوکین، داروهای ضد افسردگی مانند ایمی پرامین و نوروترپتیلین، فنوباریتال، فنی توفین، داروهای ادرار آور و کورتیکواستروئیدها مانند پردنیزولون.

مقدار و نحوه مصرف دارو

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:
مقدار کمی از ژل (۲ تا ۲/۵ سانتی متر) را روی انگشت خود قرار داده و در انتهای مقعد استعمال نمایید. دوره درمان این دارو به وضعیت شقاق مقعدی شما بستگی دارد. دوره درمان معمول این دارو ۶ تا ۸ هفته می‌باشد.

عوارض جانبی دارو

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، در صورت بروز عوارض و برطرف نشدن آن‌ها با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.
- سردرد: در صورت بروز، در اغلب موارد شدید نیست و می‌توان با داروهای مسکن ساده مثل استامینوفن آن را درمان نمود.
- سرگیجه یا احساس سبکی سر: به خصوص هنگام برخاستن از وضعیت نشسته یا خوابیده، اگر شروع به احساس سرگیجه نمودید، بشینید یا دراز بکشید تا این احساس برطرف شود.
- سوزش یا خارش یا خونریزی مقعد
- در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

شرایط نگهداری دارو

- دارو را در یخچال (در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.



ساخت پارس دارو
تهران - ایران

صدای مشتری: ۳۷۳ ۰۲۱-۷۴
www.parsdarou.ir

PANTONE:661 U ●

PANTONE: 306 U ●