

دایمتیکون ۱۸۰ (فعال شده)

کپسول ژلاتینی نرم

دایمتیکون فعال شده به صورت کپسول ژلاتینی نرم با دوز ۱۸۰ میلی گرم در بسته بندی ۳۰ عددی عرضه می شود.

موارد مصرف :

دایمتیکون فعال شده برای تسکین نفخ استفاده می شود و با کاهش کشش سطحی حباب های گاز در معده به دفع آنها کمک می کند.

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.
- رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی در پیشگیری از ایجاد نفخ موثر می باشد.
- مصرف این دارو برای کودکان بسته به سطح بیماری و بر اساس وزن آنها توسط پزشک تعیین می شود.
- این دارو بدون نسخه پزشک می تواند مصرف شود.

موارد منع مصرف دارو :

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای این دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

عوارضی از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی گزارش نشده است.

هشدارها :

- دارو را بصورت کامل بلعیده و از جویدن آن خودداری نمایید.
- در صورت ادامه علائم بیماری و عدم بهبودی با پزشک خود مشورت نمایید.

احتیاطات :

- دارو را بعد از غذا و هنگام خواب مصرف نمایید.
- دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف :

- روزانه ۱ تا ۲ عدد کپسول ژلاتینی نرم
- مصرف روزانه بیش از ۵۰۰ میلی گرم باید تحت نظر پزشک صورت گیرد.
- در صورت فراموشی یک وعده از دارو به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید و سپس طبق روال ، درمان را ادامه دهید و هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی دارو:

- عارضه جانبی رایج یا مهمی در مورد مصرف با این دارو گزارش نشده است.

شرایط نگهداری :

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



دایمتیکون ۱۸۰ (فعال شده)

کپسول ژلاتینی نرم

دایمتیکون فعال شده به صورت کپسول ژلاتینی نرم با دوز ۱۸۰ میلی گرم در بسته بندی ۳۰ عددی عرضه می شود.

موارد مصرف :

دایمتیکون فعال شده برای تسکین نفخ استفاده می شود و با کاهش کشش سطحی حباب های گاز در معده به دفع آنها کمک می کند.

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.
- رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی در پیشگیری از ایجاد نفخ موثر می باشد.
- مصرف این دارو برای کودکان بسته به سطح بیماری و بر اساس وزن آنها توسط پزشک تعیین می شود.
- این دارو بدون نسخه پزشک می تواند مصرف شود.

موارد منع مصرف دارو :

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای این دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

عوارضی از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی گزارش نشده است.

هشدارها :

- دارو را بصورت کامل بلعیده و از جویدن آن خودداری نمایید.
- در صورت ادامه علائم بیماری و عدم بهبودی با پزشک خود مشورت نمایید.

احتیاطات :

- دارو را بعد از غذا و هنگام خواب مصرف نمایید.
- دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف :

- روزانه ۱ تا ۲ عدد کپسول ژلاتینی نرم
- مصرف روزانه بیش از ۵۰۰ میلی گرم باید تحت نظر پزشک صورت گیرد.
- در صورت فراموشی یک وعده از دارو به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید و سپس طبق روال ، درمان را ادامه دهید و هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی دارو:

- عارضه جانبی رایج یا مهمی در مورد مصرف با این دارو گزارش نشده است.

شرایط نگهداری :

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



=



Pantone
319C