

- در بیماران با زمینه مشکلات قلبی عروقی، عفونت مجاری ادراری حاد، بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده فشار خون، بیماران سالمند بالای ۷۵ سال، همچنین بیماران با سابقه نارسایی قلبی و یا افت فشار خون، با احتیاط مصرف شود.
- در کلیه شرایطی که موجب اختلال در مایعات بدن می‌گردد نظیر برخی بیماری‌های دستگاه گوارش و یا بیماران تحت درمان با داروهای دیورتیک (نظیر فوروزماید) امپاتوس – پلاس® با احتیاط مصرف شود.
- قبل از عکسبرداری با مواد حاجب یددار تزریقی لازم است امپاتوس – پلاس® قطع گردد و حداقل ۴۸ ساعت پس از عکسبرداری تا بهبود عملکرد کلیوی مصرف آن به تأخیر نیافتد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

- داروهای کاهنده فشار خون (آنتولول، پروپرانولول و ...)
- داروهای مدر یا دیورتیک (همانند فوروزماید و ...)
- استروئیدهای آنابولیک (تستوسترون و ...)
- داروهای کاهنده قند خون (نظیر انسولین، گلی بنکلامید و ...)
- کورتیکواستروئیدها
- الککل، ساپتیدین، رانیتیدین، تریامترن، نیفدپین و یا دیگوکسین

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول قرص امپاتوس – پلاس® به شرح زیر است:

– بزرگسالان (افراد ۱۸ تا ۸۴ سال): دوز مصرف روزانه طبق نظر پزشک ۵۰۰/۵ میلی گرم و یا ۱۰۰۰/۵ میلی گرم دو بار در روز می باشد. در صورت نیاز دوز روزانه حداکثر به ۵۰۰/۱۲/۵ میلی گرم و یا ۱۰۰۰/۱۲/۵ میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد.

– سالمندان (افراد بالای ۸۵ سال): شروع درمان جهت کنترل قند خون در این گروه سنی توصیه نمی‌شود. – کودکان: بی خطری و کارایی دارو در کودکان بررسی نشده است لذا از مصرف آن در کودکان خودداری نمایید.

توجه: در درمان همزمان با انسولین و یا سایر داروهای محرک ترشح انسولین، ممکن است نیاز به کاهش دوز دارو باشد.

نحوه مصرف دارو:

- دارو را به همراه غذا و یا بلافاصله پس از غذا همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- دارو را به صورت روزانه و در زمان مشخصی مصرف نماید.

عوارض جانبی:

عوارض شایع: افت قند خون (هایپوگلیسمی)، عفونت‌های ادراری، افزایش حجم ادرار (پلی اوری)، خارش، عوارض گوارشی چون درد شکمی، کاهش اشتها، اسهال، تهوع و استفراغ و تغییر مزه دهانی از عوارض شایع امپاگلیفلوزین متفورمین می باشد.

عوارض نادر: کاهش جذب ویتامین B12، احتباس ادرار، لاکتیک اسیدوزیس و عوارض پوستی مانند قرمزی، خارش و کپیر از عوارض نادر امپاگلیفلوزین متفورمین می باشد.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت: (پارس دارو) تهران - ایران



صدای مشتری: ۰۲۱-۴۷۳۳۳۳۳۳
www.parsdaru.ir

امپاتوس – پلاس®

امپاگلیفلوزین / متفورمین قرص روکش دار

قرص روکش دار امپاتوس – پلاس® حاوی امپاگلیفلوزین و متفورمین هیدروکلراید با چهار دوز مختلف (۵۰۰/۵ میلی گرم، ۵۰۰/۱۲/۵ میلی گرم، ۱۰۰۰/۵ میلی گرم و ۱۰۰۰/۱۲/۵ میلی گرم) در جعبه های ۳۰ عددی (۳ پلیستر ۱۰ عددی) توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:

امپاتوس – پلاس® در درمان دیابت نوع ۲ در بیمارانی که دیابت آن‌ها با متفورمین تنها و یا متفورمین به همراه دیگر فرآورده‌های آنتی دیابتیک و یا انسولین قابل درمان نمی باشند، استفاده می‌شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف، موارد زیر را به اطلاع پزشک و یا داروساز برسانید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به متفورمین و یا امپاگلیفلوزین با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت بروز کتواسیدوزیس دیابتیک با علائمی همچون تهوع، استفراغ، بی اشتها، درد شکمی، پرنوشی، مشکل در تنفس، خستگی مفرط و بی خوابی به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- در صورت ابتلا به نارسایی های کبدی و یا کلیوی، دهیدراسیون شدید، سوختگی شدید، استفاده از مواد حاجب یددار جهت آنژیوگرافی و سی تی اسکن، جراحی و استفاده از بیهوش کننده های عمومی، در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

● بارداری: با توجه به علائم سمیت در مطالعات حیوانی، مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

● شیردهی: با توجه به ترشح دارو در شیر در مطالعات حیوانی، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدار:

- در صورت بروز علائم کتواسیدوزیس دیابتیک و یا لاکتیک اسیدوزیس به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- مصرف این دارو برای کودکان زیر ۱۰ سال توصیه نمی‌گردد.
- در بیماران با حجم خون پایین لازم است در ابتدای درمان، میزان حجم خون اصلاح گردد.
- قطع درمان با مهارکننده SGLT2 در بیمارانی که برای جراحی های مهم و یا بیماری های حاد در بیمارستان بستری می شوند، تا زمانی که وضعیت بیمار تثبیت شود، الزامی می باشد.

احتیاط:

- برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید.

- در بیماران با زمینه مشکلات قلبی عروقی، عفونت مجاری ادراری حاد، بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده فشار خون، بیماران سالمند بالای ۷۵ سال، همچنین بیماران با سابقه نارسایی قلبی و یا افت فشار خون، با احتیاط مصرف شود.
- در کلیه شرایطی که موجب اختلال در مایعات بدن می‌گردد نظیر برخی بیماری‌های دستگاه گوارش و یا بیماران تحت درمان با داروهای دیورتیک (نظیر فوروزماید) امپاتوس – پلاس® با احتیاط مصرف شود.
- قبل از عکسبرداری با مواد حاجب یددار تزریقی لازم است امپاتوس – پلاس® قطع گردد و حداقل ۴۸ ساعت پس از عکسبرداری تا بهبود عملکرد کلیوی مصرف آن به تأخیر نیافتد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

- داروهای کاهنده فشار خون (آنتولول، پروپرانولول و ...)
- داروهای مدر یا دیورتیک (همانند فوروزماید و ...)
- استروئیدهای آنابولیک (تستوسترون و ...)
- داروهای کاهنده قند خون (نظیر انسولین، گلی بنکلامید و ...)
- کورتیکواستروئیدها
- الکلی، ساپتیدین، رانیتیدین، تریامترن، نیفدپین و یا دیگوکسین

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول قرص امپاتوس – پلاس® به شرح زیر است:

– بزرگسالان (افراد ۱۸ تا ۸۴ سال): دوز مصرف روزانه طبق نظر پزشک ۵۰۰/۵ میلی گرم و یا ۱۰۰۰/۵ میلی گرم دو بار در روز می باشد. در صورت نیاز دوز روزانه حداکثر به ۵۰۰/۱۲/۵ میلی گرم و یا ۱۰۰۰/۱۲/۵ میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد.

– سالمندان (افراد بالای ۸۵ سال): شروع درمان جهت کنترل قند خون در این گروه سنی توصیه نمی‌شود. – کودکان: بی خطری و کارایی دارو در کودکان بررسی نشده است لذا از مصرف آن در کودکان خودداری نمایید.

توجه: در درمان همزمان با انسولین و یا سایر داروهای محرک ترشح انسولین، ممکن است نیاز به کاهش دوز دارو باشد.

نحوه مصرف دارو:

- دارو را به همراه غذا و یا بلافاصله پس از غذا همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- دارو را به صورت روزانه و در زمان مشخصی مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

عوارض شایع: افت قند خون (هایپوگلیسمی)، عفونت‌های ادراری، افزایش حجم ادرار (پلی اوری)، خارش، عوارض گوارشی چون درد شکمی، کاهش اشتها، اسهال، تهوع و استفراغ و تغییر مزه دهانی از عوارض شایع امپاگلیفلوزین متفورمین می‌باشد.

عوارض نادر: کاهش جذب ویتامین B12، احتباس ادرار، لاکتیک اسیدوزیس و عوارض پوستی مانند قرمزی، خارش و کپیر از عوارض نادر امپاگلیفلوزین متفورمین می‌باشد.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت: (پارس دارو) تهران - ایران



صدای مشتری: ۰۲۱-۴۷۳۳۳۳۳
www.parsdaru.ir

امپاتوس – پلاس®

امپاگلیفلوزین / متفورمین

قرص روکش دار

قرص روکش دار امپاتوس – پلاس® حاوی امپاگلیفلوزین و متفورمین هیدروکلراید با چهار دوز مختلف (۵۰۰/۵ میلی گرم، ۵۰۰/۱۲ میلی گرم، ۱۰۰۰/۵ میلی گرم و ۱۰۰۰/۱۲ میلی گرم) در جعبه های ۳۰ عددی (۳ پلیستر ۱۰ عددی) توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:

امپاتوس – پلاس® در درمان دیابت نوع ۲ در بیمارانی که دیابت آن‌ها با متفورمین تنها و یا متفورمین به همراه دیگر فرآورده‌های آنتی دیابتیک و یا انسولین قابل درمان نمی باشند، استفاده می‌شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف، موارد زیر را به اطلاع پزشک و یا داروساز برسانید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری‌های دیگر
- اختلال حافظه و عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به متفورمین و یا امپاگلیفلوزین با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت بروز کتواسیدوزیس دیابتیک با علائمی همچون تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، درد شکمی، پرنوشی، مشکل در تنفس، خستگی مفرط و بی‌خوابی به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- در صورت ابتلا به نارسایی‌های کبدی و یا کلیوی، دهیدراسیون شدید، سوختگی شدید، استفاده از مواد حاجب یددار جهت آنژیوگرافی و سی تی اسکن، جراحی و استفاده از بیهوش کننده‌های عمومی، در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

• بارداری: با توجه به علائم سمیت در مطالعات حیوانی، مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

• شیردهی: با توجه به ترشح دارو در شیر در مطالعات حیوانی، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدار:

- در صورت بروز علائم کتواسیدوزیس دیابتیک و یا لاکتیک اسیدوزیس به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- مصرف این دارو برای کودکان زیر ۱۰ سال توصیه نمی‌گردد.
- در بیماران با حجم خون پایین لازم است در ابتدای درمان، میزان حجم خون اصلاح گردد.
- قطع درمان با مهارکننده SGLT2 در بیمارانی که برای جراحی‌های مهم و یا بیماری‌های حاد در بیمارستان بستری می‌شوند، تا زمانی که وضعیت بیمار تثبیت شود، الزامی می‌باشد.

احتیاط:

- برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید.



333U
PANTONE