

- این دارو باعث افزایش LDL خون می‌گردد لذا کنترل LDL در طول دوره درمان با این دارو مورد نیاز است.
- در موارد زیر به دلیل افزایش احتمال بروز عارضه دهیدراسمیون (کاهش حجم مایعات بدن)، توصیه می‌گردد مصرف امپاتوس® با احتیاط صورت گیرد:
 - در افراد با سابقه نارسایی قلبی و یا بیماری‌های قلبی و عروقی
 - افراد بالای ۷۵ سال
 - مصرف‌کنندگان داروهای ضد فشار خون و داروهای مدر نظیر فوروزماید
 - در افراد با سابقه فشار خون پایین

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

- داروهای کاهنده فشار خون (آنتولول، پروپرانولول و ...)
- داروهای مدر (همانند فوروزماید و ...)
- استروئید آنابولیک (تستوسترون و ...)
- داروهای کاهنده قند خون (انسولین، گلی‌بنکلامید و ...)
- کورتیکواستروئید ها (نظیر دکزامتازون، بتامتازون و ...)

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

– بزرگسالان (افراد بالای ۱۸ سال): دوز مصرف روزانه ۱۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد. در صورت نیاز و یا افزایش مقاومت بدن به دارو با توجه به نظر پزشک معالج، دوز مصرفی حداکثر به ۲۵ میلی‌گرم در روز افزایش می‌یابد.

– سالمندان (افراد بالای ۷۵ سال): شروع درمان جهت کنترل قند خون با این دارو توصیه نمی‌شود. – کودکان: بی‌خطری و کارایی این دارو در کودکان بررسی نشده است، لذا از مصرف آن در کودکان خودداری نمایید.

● در درمان همزمان با انسولین و یا داروهای محرک ترشح انسولین، ممکن است کاهش دوز دارو مورد نیاز باشد.

● در بیماران با نارسایی‌های کبدی و کلیوی نیاز به تنظیم دوز وجود دارد.

● در صورت فراموش نمودن نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. در صورت نزدیک شدن به دوز بعدی، نوبت فراموش شده را رها کرده و از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری نمایید.

نحوه مصرف دارو:

● دارو را به همراه غذا و یا با شکم خالی همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

● دارو را به صورت روزانه و در زمان مشخصی مصرف نمایید.

عوارض جانبی دارو:

عوارض شایع:

● افت قند خون (در صورت مصرف همزمان با دیگر داروهای کاهنده قند خون احتمال بروز این عارضه وجود دارد)

● تکرر ادرار

● عفونت مجاری ادراری و واژینال

● خارش

عوارض نادر:

● احساس درد و سوزش حین ادرار

● دهیدراسمیون

شرایط نگهداری:

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

● در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

● تا اتمام مصرف، دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

ساخت: پارس دارو»
تهران-ایران



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۳۳۳
www.parsdarou.ir

امپاتوس®

امپاگلیفلوزین ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم

قرص روکش دار خط دار

قرص روکش دار خط دار امپاتوس® در دو دوز ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم و در بلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

امپاتوس® در درمان دیابت نوع ۲ در افراد بزرگسال (بالاتر از ۱۸ سال) به صورت درمان واحد و یا ترکیبی (به همراه انسولین و یا دیگر داروهای آنتی دیابتیک) استفاده می‌شود.

راهنمای عمومی برای بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

● برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید.

● قبل از مصرف، موارد زیر را به اطلاع پزشک و یا داروساز برسانید:

● وجود هر گونه حساسیت

● بارداری یا شیردهی

● استفاده از سایر داروها

● ابتلا به بیماری‌های دیگر

● اختلال حافظه و عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

● در صورت ابتلا به نارسایی‌های شدید کلیوی در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

● در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به امپاگلیفلوزین با پزشک خود مشورت نمایید.

● در صورت بروز کتواسیدوزیس با علائمی چون تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، درد شکمی، پرنوشی، مشکلات تنفسی، گیجی، خستگی مفرط و اختلالات خواب، به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

● دوران بارداری: با توجه به نتایج بررسی سمیت این دارو در حیوانات، مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

● دوران شیردهی: با توجه به ترشح دارو در شیر حیوانات، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها:

● در بیماران دیابتی با مشکل کتواسیدوزیس مصرف نشود.

● در صورت نارسایی شدید کلیوی از مصرف این دارو خودداری نمایید.

● قطع درمان با مهارکننده SGLT2 در بیمارانی که برای جراحی‌های مهم و یا بیماری‌های حاد در بیمارستان بستری می‌شوند، تا زمانی که وضعیت بیمار تثبیت شود، الزامی می‌باشد.

احتیاطات:

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

● مقدار قند خون را در زمان مصرف این دارو کنترل نمایید در صورت کاهش و یا افزایش مقدار قند خون، به پزشک معالج اطلاع دهید.

● قبل از شروع مصرف امپاتوس® و یا افزودن سایر داروها، لازم است عملکرد کلیوی ارزیابی گردد.

- این دارو باعث افزایش LDL خون می‌گردد لذا کنترل LDL در طول دوره درمان با این دارو مورد نیاز است.
- در موارد زیر به دلیل افزایش احتمال بروز عارضه دهیدراسیون (کاهش حجم مایعات بدن) ، توصیه می‌گردد مصرف امپاتوس® با احتیاط صورت گیرد :
 - در افراد با سابقه نارسایی قلبی و یا بیماری های قلبی و عروقی
 - افراد بالای ۷۵ سال
 - مصرف کنندگان داروهای ضد فشار خون و داروهای مدر نظیر فوروزماید
 - در افراد با سابقه فشار خون پایین

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید :

- داروهای کاهنده فشار خون (آنتولول، پروپرانولول و ...)
- داروهای مدر (همانند فوروزماید و ...)
- استروئید آنابولیک (تستوسترون و ...)
- داروهای کاهنده قند خون (انسولین، گلی بنکلامید و ...)
- کورتیکواستروئید ها (نظیر دکزامتازون، بتامتازون و ...)

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید ، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

– بزرگسالان (افراد بالای ۱۸ سال) : دوز مصرف روزانه ۱۰ میلی گرم یکبار در روز می باشد . در صورت نیاز و یا افزایش مقاومت بدن به دارو با توجه به نظر پزشک معالج ، دوز مصرفی حداکثر به ۲۵ میلی گرم در روز افزایش می یابد .

– سالمندان (افراد بالای ۷۵ سال) : شروع درمان جهت کنترل قند خون با این دارو توصیه نمی شود .
– کودکان : بی خطری و کارایی این دارو در کودکان بررسی نشده است ، لذا از مصرف آن در کودکان خودداری نمایید .

● در درمان همزمان با انسولین و یا داروهای محرک ترشح انسولین ، ممکن است کاهش دوز دارو مورد نیاز باشد .

● در بیماران با نارسایی های کبدی و کلیوی نیاز به تنظیم دوز وجود دارد .

● در صورت فراموش نمودن نوبت مصرف دارو ، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید . در صورت نزدیک شدن به دوز بعدی ، نوبت فراموش شده را رها کرده و از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری نمایید .

نحوه مصرف دارو :

● دارو را به همراه غذا و یا با شکم خالی همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید .

● دارو را به صورت روزانه و در زمان مشخصی مصرف نمایید .

عوارض جانبی دارو:

عوارض شایع :

● افت قند خون (در صورت مصرف همزمان با دیگر داروهای کاهنده قند خون احتمال بروز این عارضه وجود دارد)

● تکرر ادرار

● عفونت مجاری ادراری و واژینال

● خارش

● عوارض نادر :

● احساس درد و سوزش حین ادرار

● دهیدراسیون

شرایط نگهداری:

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

● در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری شود .

● تا اتمام مصرف ، دارو را درون جعبه نگهداری نمایید .

ساخت: پارس دارو®
تهران- ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۳۳۳
www.parsdarou.ir

امپاتوس®

امپاگلیفلوزین ۱۰ و ۲۵ میلی گرم

قرص روکش دار خط دار

قرص روکش دار خط دار امپاتوس® در دو دوز ۱۰ و ۲۵ میلی گرم و در بلیستر های ۱۰ عددی و در جعبه ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) توسط شرکت داروسازی پارس دارو تولید و به بازار عرضه می شود.

موارد مصرف :

امپاتوس® در درمان دیابت نوع ۲ در افراد بزرگسال (بالاتر از ۱۸ سال) به صورت درمان واحد و یا ترکیبی (به همراه انسولین و یا دیگر داروهای آنتی دیابتیک) استفاده می شود .

راهنمای عمومی برای بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید .

● برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید .

● قبل از مصرف ، موارد زیر را به اطلاع پزشک و یا داروساز برسانید :

● وجود هر گونه حساسیت

● بارداری یا شیردهی

● استفاده از سایر داروها

● ابتلا به بیماری های دیگر

● اختلال حافظه و عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف :

● در صورت ابتلا به نارسایی های شدید کلیوی در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید .

● در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به امپاگلیفلوزین با پزشک خود مشورت نمایید .

● در صورت بروز کتواسیدوزیس با علائمی چون تهوع ، استفراغ ، بی اشتها، بی شکمی ، پرنوشی ، مشکلات تنفسی، گیجی، خستگی مفرط و اختلالات خواب، به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید .

مصرف در بارداری و شیردهی:

● دوران بارداری: با توجه به نتایج بررسی سمیت این دارو در حیوانات، مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

● دوران شیردهی: با توجه به ترشح دارو در شیر حیوانات، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها:

● در بیماران دیابتی با مشکل کتواسیدوزیس مصرف نشود .

● در صورت نارسایی شدید کلیوی از مصرف این دارو خودداری نمایید .

● قطع درمان با مهارکننده SGLT2 در بیمارانی که برای جراحی های مهم و یا بیماری های حاد در بیمارستان بستری می شوند ، تا زمانی که وضعیت بیمار تثبیت شود ، الزامی می باشد .

احتیاطات:

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

● مقدار قند خون را در زمان مصرف این دارو کنترل نمایید در صورت کاهش و یا افزایش مقدار قند خون ، به پزشک معالج اطلاع دهید .

● قبل از شروع مصرف امپاتوس® و یا افزودن سایر داروها ، لازم است عملکرد کلیوی ارزیابی گردد .



314U
PANTONE