

فلوکونازول

(کپسول ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم)

مطالب لازم برای بیمار :

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو :

- این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :

- وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو و مواد دیگر اعم از دارویی و غذایی.
- حاملگی یا شیردهی
- استفاده همزمان این دارو با داروی دیگر.
- داشتن بیماریهایی نظیر : نارسایی کلیوی، بیماریهای دستگاه گوارش خصوصاً مشکلات معدی، بیماریهای کبد، افراد با سابقه استفاده از الکل.

توجه :

- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمائید.
- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا میل کنید.
- در طول درمان با این دارو به طور منظم با پزشک خود در تماس باشید.
- اگر نشانه های بیماری در طول چند هفته یا برای برخی بیماریها در طول چند ماه بهبود نیافت حتماً به پزشک مربوطه مراجعه نمائید.

مقدار مصرف دارو :

- مقدار و نحوه مصرف این دارو را فقط پزشک تعیین می کند.
- هرگز این دارو را بدون دستور پزشک مصرف نکنید.

عوارض جانبی :

- هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه ممکن است تمام این عوارض در یک شخص دیده نشود لیکن در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک خود مشورت کنید.

تب و لرز، ایجاد بثورات جلدی، بندرت ادرار تیره یا کهریایی، تب و گلودرد، مدفوع کمرنگ، عوارض پوستی مثل قرمزی یا نازک شدن پوست یا مخاط، درد معده، خستگی و ضعف، زرد شدن چشمها و پوست، خونریزی و کم اشتها.

- عوارضی که نیاز به توجه پزشکی ندارند اما در صورت ادامه آنها باید با پزشک مشورت نمود شامل: یبوست، تهوع، سرگیجه، اسهال و استفراغ می باشد.

شرایط نگهداری دارو:

- این دارو را دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

ساخت: پارس دارو ||
تهران - ایران



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۲۷۳
www.parsdarou.ir
Reference : USP DI 2007

فلوکونازول

(کپسول ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم)

مطالب لازم برای بیمار:

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو و مواد دیگر اعم از دارویی و غذایی.
- حاملگی یا شیردهی
- استفاده همزمان این دارو با داروی دیگر.
- داشتن بیماریهایی نظیر: نارسایی کلیوی، بیماریهای دستگاه گوارش خصوصاً مشکلات معدی، بیماریهای کبد، افراد با سابقه استفاده از الکل.

توجه:

- دارو را مطابق با تجویز پزشک مصرف نمائید.
- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا میل کنید.
- در طول درمان با این دارو به طور منظم با پزشک خود در تماس باشید.
- اگر نشانه های بیماری در طول چند هفته یا برای برخی بیماریها در طول چند ماه بهبود نیافت حتماً به پزشک مربوطه مراجعه نمائید.

مقدار مصرف دارو:

- مقدار و نحوه مصرف این دارو را فقط پزشک تعیین می کند.
- هرگز این دارو را بدون دستور پزشک مصرف نکنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه ممکن است تمام این عوارض در یک شخص دیده نشود لیکن در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک خود مشورت کنید.

تب و لرز، ایجاد بثورات جلدی، بندرت ادرار تیره یا کهریایی، تب و گلودرد، مدفوع کمرنگ، عوارض پوستی مثل قرمزی یا نازک شدن پوست یا مخاط، درد معده، خستگی و ضعف، زرد شدن چشمها و پوست، خونریزی و کم اشتها.

- عوارضی که نیاز به توجه پزشکی ندارند اما در صورت ادامه آنها باید با پزشک مشورت نمود شامل: یبوست، تهوع، سرگیجه، اسهال و استفراغ می باشد.

شرایط نگهداری دارو:

- این دارو را دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

ساخت: پارس دارو
تهران - ایران



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۲۷۳
www.parsdarou.ir
Reference : USP DI 2007



=



520U
PANTONE