

کتوتیفن

قرص ۱ میلی گرمی

مطالب لازم برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :
- وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو و مواد دیگر اعم از دارویی یا غذایی.
- بارداری و شیردهی.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر از قبیل آنتی بیوتیک ها ، آنتی هیستامین ها ، آرامبخش ها یا خواب آورها.
- وجود بیماریهای دستگاه عصبی شامل تشنج یا صرع.
- ابتلاء به بیماریهای اختلال حرکتی.

موارد احتیاط :

- در طول درمان با این دارو، مراجعات مکرر به پزشک معالج برای پیگیری روند بهبودی بیماری ضروری می باشد.
- احتمالاً با نظر پزشک معالج، در طول مصرف کتوتیفن، برای پیگیری عوارض جانبی دارو، آزمایش شمارش پلاکتهای خونی انجام می پذیرد.

نکات قابل توصیه :

- با توجه به اینکه این دارو موجب خواب آلودگی و سرگیجه می گردد ، توصیه می گردد همزمان با مصرف این دارو ، بخصوص در اوایل دوره درمان از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به دقت بالا دارند اجتناب کنید.
- این دارو موجب پیشگیری از حملات آسم می گردد ولی درمان آن را سبب نمی شود.
- برای حصول تأثیر بهینه این دارو، مصرف مداوم آن ضروری می باشد.
- در صورت مصرف مداوم این دارو، بروز عوارض جانبی و شدت آنها به حداقل ممکن خواهد رسید.
- در صورت نیاز به قطع مصرف کتوتیفن، این دارو باید به تدریج و در مدت ۲ تا ۴ هفته قطع شود.
- برای به حداقل رساندن عارضه خواب آلودگی دارو، بهتر است میزان مصرف آن به تدریج افزایش یابد.
- در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو بلافاصله آن را مصرف نمائید، مگر آنکه مدت زمان کوتاهی به مصرف نوبت بعدی مانده باشد که در این صورت نیازی به مصرف دوز فراموش شده نبوده

و مصرف نوبت های دیگر را طبق فواصل تنظیم شده ادامه دهید به هیچ وجه مقدار مصرف نوبت بعدی را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.
- در صورت مشاهده هر یک از عوارض زیر بیمار باید بلافاصله تحت اقدامات درمانی قرار گیرد:
- علائم مشابه سرماخوردگی مثل تب و لرز، اسهال، کاهش اشتها.
- عفونت تنفسی با علائم سرفه، تب و گلودرد.
- عفونت مثانه (ادرار خونی و دردناک)
- اریتماتوز (خارش، قرمزی و پوسته پوسته شدن پوست).
- عفونت کبدی (درد شکمی، تهوع، سردرد و کاهش اشتها).
- حملات صرعی (اسپاسم عضلانی و از دست دادن ناگهانی هوشیاری).
- عوارض زیر تنها در صورت تداوم نیاز به اقدامات درمانی دارند:
- افزایش وزن.

- درد شکمی، تحریک پذیری بیش از حد، خشکی دهان، افزایش اشتها، خواب آلودگی، راش های پوستی، اختلال در خواب و افتادگی پلکها.

مصرف بیش از حد دارو:

- علائم مصرف بیش از حد دارو عبارتند از : کما، گیجی، بی قراری، کاهش فشارخون، خواب آلودگی و تپش قلب.
- برای درمان مصرف بیش از حد دارو، در صورتیکه مدت زمان زیادی از مصرف دارو نگذشته باشد، تخلیه معده صورت می پذیرد، در غیر این صورت درمان علامتی انجام می شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف دارو را پزشک برحسب شرایط بیمار تعیین می کند ولی میزان مصرف معمول این دارو در بزرگسالان و کودکان بالای ۳ سال به صورت یک قرص صبح و یک قرص شب می باشد.
- می توان این دارو را همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.


شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.



ساخت (پارس دارو)
تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳
www.parsdarou.ir
Reference: USP DI 2007



کتوتیفن قرص ۱ میلی گرمی

مطالب لازم برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :
- وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو و مواد دیگر اعم از دارویی یا غذایی.
- بارداری و شیردهی.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر از قبیل آنتی بیوتیک ها ، آنتی هیستامین ها ، آرامبخش ها یا خواب آورها.
- وجود بیماریهای دستگاه عصبی شامل تشنج یا صرع.
- ابتلاء به بیماریهای اختلال حرکتی.

موارد احتیاط :

- در طول درمان با این دارو، مراجعات مکرر به پزشک معالج برای پیگیری روند بهبودی بیماری ضروری می باشد.
- احتمالاً با نظر پزشک معالج، در طول مصرف کتوتیفن، برای پیگیری عوارض جانبی دارو، آزمایش شمارش پلاکتهای خونی انجام می پذیرد.

نکات قابل توصیه :

- با توجه به اینکه این دارو موجب خواب آلودگی و سرگیجه می گردد، توصیه می گردد همزمان با مصرف این دارو، بخصوص در اوایل دوره درمان از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به دقت بالا دارند اجتناب کنید.
- این دارو موجب پیشگیری از حملات آسم می گردد ولی درمان آن را سبب نمی شود.
- برای حصول تأثیر بهینه این دارو، مصرف مداوم آن ضروری می باشد.
- در صورت مصرف مداوم این دارو، بروز عوارض جانبی و شدت آنها به حداقل ممکن خواهد رسید.
- در صورت نیاز به قطع مصرف کتوتیفن، این دارو باید به تدریج و در مدت ۲ تا ۴ هفته قطع شود.
- برای به حداقل رساندن عارضه خواب آلودگی دارو، بهتر است میزان مصرف آن به تدریج افزایش یابد.
- در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو بلافاصله آن را مصرف نمائید، مگر آنکه مدت زمان کوتاهی به مصرف نوبت بعدی مانده باشد که در این صورت نیازی به مصرف دوز فراموش شده نبوده

و مصرف نوبت های دیگر را طبق فواصل تنظیم شده ادامه دهید به هیچ وجه مقدار مصرف نوبت بعدی را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.
- در صورت مشاهده هر یک از عوارض زیر بیمار باید بلافاصله تحت اقدامات درمانی قرار گیرد :
- علائم مشابه سرماخوردگی مثل تب و لرز، اسهال، کاهش اشتها.
- عفونت تنفسی با علائم سرفه، تب و گلودرد.
- عفونت مثانه (ادرار خونی و دردناک)
- اریتماتوز (خارش، قرمزی و پوسته پوسته شدن پوست).
- عفونت کبدی (درد شکمی، تهوع، سردرد و کاهش اشتها).
- حملات صرعی (اسپاسم عضلانی و از دست دادن ناگهانی هوشیاری).
- عوارض زیر تنها در صورت تداوم نیاز به اقدامات درمانی دارند :
- افزایش وزن.

- درد شکمی، تحریک پذیری بیش از حد، خشکی دهان، افزایش اشتها، خواب آلودگی، راش های پوستی، اختلال در خواب و افتادگی پلکها.

مصرف بیش از حد دارو:

- علائم مصرف بیش از حد دارو عبارتند از : کما، گیجی، بی قراری، کاهش فشارخون، خواب آلودگی و تپش قلب.
- برای درمان مصرف بیش از حد دارو، در صورتیکه مدت زمان زیادی از مصرف دارو نگذشته باشد، تخلیه معده صورت می پذیرد، در غیر این صورت درمان علامتی انجام می شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف دارو را پزشک برحسب شرایط بیمار تعیین می کند ولی میزان مصرف معمول این دارو در بزرگسالان و کودکان بالای ۳ سال به صورت یک قرص صبح و یک قرص شب می باشد.
- می توان این دارو را همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.



ساخت (پارس دارو) «
تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳
www.parsdarou.ir
Reference: USP DI 2007