مترونیدازول

قرص خوراکی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی

مطالب لازم برای بیمار :

۱ ـ این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری کنید .

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید .

- وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو و موارد دیگر اعم از دارونی و غذائی.
- بارداری و شیردهی.
- افراد الکلیسم.
- در صورت مصرف همزمـان ایـن دارو با داروهای دیگر از جملـه آنتی کوآگولانت هـای کومـارینی، سایمتیدین، دی سولفیرام، لیتیم، فنوباربیتال، فنی توئین.
- داشتن بیماریهایی نظیر مشکلات مغزی، بیماری خونی، بیماری کبدی و بیماریهای دیگر .

توجه

- از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید .
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف بعدی دارو فرا رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو اجتناب ورزید و دوز بعدی را در زمان تعیین شده مصرف نمایید .
- در هنگام استفاده از دارو از مصرف نوشیدنی های حاوی الکل خودداری نمایید .
- در هنگام استفاده از دارو در صورت انجام تست های آزمایشگاهی، آزمایشگاه را از مصرف این دارو مطلع سازید .
- در کودکان و سالمندان با احتیاط مصرف شود .
- در صورت استفاده دارو در بیماریهای مقاربتی، در هنگام نزدیکی از کاندوم استفاده نمایید .
- برای کاهش عوارض گوارشی دارو را با غذا میل کنید .
- دوره درمان را کامل کنید .

مقدار مصرف دارو

- مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند . هرگز این دارو را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید .

عوارض جانبی دارو

هر دارو بـه موازات اثـر درمـانی مطلوب باعث عوارض ناخواستـه نیز می گردد که در صورت بـروز این عوارض با پزشک مشورت نمایید :

حساسیت بیش از حد ، مشکلات خونی، سمیت مغزی، عفونت های قارچی واژینال، حملات تشنجی و مشکلات مربوط به اعصاب محیطی، مشکلات کبدی، اثر روی مجاری ادرار و ترمبوفلبیت.

عوارضی که در صورت تداوم نیاز به مشورت با پزشک د ارند :

مشکلات مغزی مثل سرگیجه، سردرد ، احساس سبکی سر ، مشکلات گوارشی، عوض شدن طعم دهان،احساس طعم فلزی در دهان و خشکی دهان.

این دارو به ندرت باعث تیرگی ادرار می گردد که نیاز به توجه پزشکی ندارد .

عوارض مصرف بیش از حد دارو :

مشکلات مربوط بـه اعصاب حسی محیطی شامل کرختی، درد دست و پا و یا حملات تشنجی در صورت مصرف بیش از حد دارو فوراً با مرکز مسمومیت تماس بگیرید .

شرایط نگهداری دارو :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

ساخت « پارس دارو »
تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳
Ref: USP DI 2007

مترونیدازول

قرص خوراکی ۲۵۰ و۵۰۰ میلی گرمی

مطالب لازم برای بیمار :

۱ ـ این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری کنید .

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید .

- وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو و موارد دیگر اعم از دارویی و غذائی.
- بارداری و شیردهی.
- افراد الکلیسم.
- در صورت مصرف همزمـان ایـن دارو با داروهای دیگر از جملـه آنتی کوآگولانت هـای کومـارینی، سایمتیدین، دی سولفیرام، لیتیم، فنوباربیتال، فنی توئین.
- داشتن بیماریهایی نظیر مشکلات مغزی، بیماری خونی، بیماری کبدی و بیماریهای دیگر .

توجه

- از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید .
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف بعدی دارو فرا رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو اجتناب ورزید و دوز بعدی را در زمان تعیین شده مصرف نمایید .
- در هنگام استفاده از دارو از مصرف نوشیدنی های حاوی الکل خودداری نمایید .
- در هنگام استفاده از دارو در صورت انجام تست های آزمایشگاهی، آزمایشگاه را از مصرف این دارو مطلع سازید .
- در کودکان و سالمندان با احتیاط مصرف شود .
- در صورت استفاده دارو در بیماریهای مقاربتی، در هنگام نزدیکی از کاندوم استفاده نمایید .
- برای کاهش عوارض گوارشی دارو را با غذا میل کنید .
- دوره درمان را کامل کنید .

مقدار مصرف دارو

- مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند . هرگز این دارو را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید .

عوارض جانبی دارو

هر دارو بـه موازات اثـر درمـانی مطلوب باعث عوارض ناخواستـه نیز می گردد که در صورت بـروز این عوارض با پزشک مشورت نمایید :

حساسیت بیش از حد ، مشکلات خونی، سمیت مغزی، عفونت های قارچی واژینال، حملات تشنجی و مشکلات مربوط به اعصاب محیطی، مشکلات کبدی، اثر روی مجاری ادرار و ترمبوفلبیت.

عوارضی که در صورت تداوم نیاز به مشورت با پزشک د ارند :

مشکلات مغزی مثل سرگیجه، سردرد ، احساس سبکی سر ، مشکلات گوارشی، عوض شدن طعم دهان،احساس طعم فلزی در دهان و خشکی دهان.

این دارو به ندرت باعث تیرگی ادرار می گردد که نیاز به توجه پزشکی ندارد .

عوارض مصرف بیش از حد دارو :

مشکلات مربوط بـه اعصاب حسی محیطی شامل کرخی، درد دست و پا و یا حملات تشنجی در صورت مصرف بیش از حد دارو فوراً با مرکز مسمومیت تماس بگیرید .

شرایط نگهداری دارو :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳

Ref: USP DI 2007

Pantone 526C