

# متروواژ® ۰/۷۵ درصد (مترونیداژول) ژل واژینال

موارد مصرف:

واژینوز میکروبی (هموفیلوس واژینیت، گاردنر لایواژینیت، کورینه باکتریوم واژینیت، واژینوز بی هوازی و واژینیت غیر اختصاصی) راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو

● همیشه در نظر داشته باشید این دارو فقط برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده و نباید برای افراد دیگر یا بیمارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

● در ضمن مصرف دارو از پنبه بهداشتی یا نوار بهداشتی استفاده کنید و شورت نخی بپوشید.

● پس از دوره درمان اگر بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

● در طی دوره درمان برای جلوگیری از آلودگی مجدد موازین بهداشت شخصی را کاملاً رعایت نموده و از مقاربت اجتناب ورزید.

● دوره درمان را کامل کنید (حتی در دوران قاعدگی).

● قبل از مصرف این دارو در موارد زیر یا پزشک خود مشورت کنید:

● بارداری و شیردهی.

● داشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل و یا سابقه آنها.

● در صورت داشتن اختلالات خونی، عصبی مانند صرع، قلبی، کبدی.

● در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر.

● مقدار و نحوه مصرف دارو:

● مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند در صورتیکه توصیه خاصی نشده باشد مقدار مصرف معمولی شرح ذیل است:

● یک اپلیکاتور کامل از ژل را یک یا دو نوبت در روز به مدت ۵ روز در واژن استفاده کنید.

تداخلات دارویی:

الکل، آنتی کوآولانت ها، کومارین یا مشتقات اینداندینون، سایمتیدین، دی سولفیرام، لیتیم، داروهای اعصاب، فنی تونین.

طبقه بندی مصرف در بارداری: گروه B.

عوارض جانبی:


اکثر داروها در کنار اثر درمانی مفید ممکن است بعضی اثرات ناخواسته را نیز در نزد بیمار ایجاد نمایند.

اگرچه همه این عوارض جانبی ممکن است پیش نیاید اما در صورت وقوع هر یک از آنها با یستی با پزشک خود مشورت کنید، ایجاد اسپهال، سرگیجه، سردرد، از دست دادن اشتها، استفراغ یا تهوع، درد معده، طعم قازی در دهان، خشکی دهان، باردار شدن زنان و به ندرت ممکن است عوارض جانبی شامل التهاب، خونریزی یا خشکی در واژن، تیره شدن مدفوع، عدم توانایی در کنترل ادرار، یبوست، اختلالات فکری، اختلالات تشنجی مانند حملات صرعی، بیثورات جلدی، قرمزی، خارش، گلودرد، تب و بی حسی، ضعف در دستها و پاها دیده شود. چنانچه عوارض جانبی دیگری به غیر از آنچه در این بروشور قید گردیده مشاهده شد با پزشک و یا داروساز تماس بگیرید.

راهنماییهای مصرف:

● دست ها را قبل و بعد از مصرف دارو شسته و از تماس دارو با چشم جلوگیری شود.

● تیوب ژل را از جعبه خارج نموده و به کمک درب پلاستیکی ژل، پوشش آلومینیومی تیوب را سوراخ نمایید.



● سر تیوب ژل را به قسمت ۲ (مطابق شکل) با کمی فشار متصل کنید. یا یک دست اپلیکاتور را نگهداشته و با

دست دیگر تیوب ژل را فشار دهید تا لوله اپلیکاتور پر از ژل شده و میله آن تا انتها به عقب برگردد.



● بهتر است به پشت خوابیده و اپلیکاتور سر از ژل را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو برده و سپس

قسمت ۱ (مطابق شکل) را فشار داده تا ژل در عمق واژن تخلیه گردد.

● شرايط نگهداری:

● دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند.

● دارو را دور از دسترسی کودکان نگهداری کنید.

ساخت (پارس دارو)



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Ref: USP DI 2007

تهران - ایران

# متروواژ® ۰/۷۵ درصد (مترونیداژول) ژل واژینال

## موارد مصرف:

واژینوز میکروبی (هموفیلوس واژینیت، گاردنر لایواژینیت، کورینه باکتریوم واژینیت، واژینوز بی هوازی و واژینیت غیر اختصاصی) راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو

● همیشه در نظر داشته باشید این دارو فقط برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده و نباید برای افراد دیگر یا بیمارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

● در ضمن مصرف دارو از پنبه بهداشتی یا نوار بهداشتی استفاده کنید و شورت نخی بپوشید.

● پس از دوره درمان اگر بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

● در طی دوره درمان برای جلوگیری از آلودگی مجدد موازین بهداشت شخصی را کاملاً رعایت نموده و از مقاربت اجتناب ورزید.

● دوره درمان را کامل کنید (حتی در دوران قاعدگی).

● قبل از مصرف این دارو در موارد زیر یا پزشک خود مشورت کنید:

● بارداری و شیردهی.

● داشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل و یا سابقه آنها.

● در صورت داشتن اختلالات خونی، عصبی مانند صرع، قلبی، کبدی.

● در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر.

● مقدار و نحوه مصرف دارو:

● مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند در صورتیکه توصیه خاصی نشده باشد مقدار مصرف معمولی شرح ذیل است:

● یک اپلیکاتور کامل از ژل را یک یا دو نوبت در روز به مدت ۵ روز در واژن استفاده کنید.

## تداخلات دارویی:

● الکل، آنتی کوآگولانت ها، کومارین یا مشتقات اینداندینون، سایمتیدین، دی سولفیرام، لیتیم، داروهای اعصاب قتی، توفین.

● طبقه بندی مصرف در بارداری: گروه B.

● عوارض جانبی:

اکثر داروها در کنار اثر درمانی مفید ممکن است بعضی اثرات ناخواسته را نیز در نزد بیمار ایجاد نمایند.

اگرچه همه این عوارض جانبی ممکن است پیش نیاید اما در صورت وقوع هر یک از آنها با یستی با پزشک خود مشورت کنید:


● ایجاد اسهال، سرگیجه، سردرد، از دست دادن اشتها، استفراغ یا تهوع، درد معده، طعم قاری در دهان، خشکی دهان، باردار.

● شدن زبان و به ندرت ممکن است عوارض جانبی شامل التهاب، خونریزی یا خشکی در واژن، تیره شدن مدفوع، عدم توانایی در کنترل ادرار، یبوست، اختلالات فکری، اختلالات تشنجی مانند حملات صرعی، بیثورات جلدی، قرمزی، خارش، گلودرد، تب و بی حسی، ضعف در دستها و پاها دیده شود. چنانچه عوارض جانبی دیگری به غیر از آنچه در این بروشور قید گردیده مشاهده شد با پزشک و یا داروساز تماس بگیرید.

● راهنماییهای مصرف:

● دست ها را قبل و بعد از مصرف دارو شسته و از تماس دارو با چشم جلوگیری شود.

● تیوب ژل را از جعبه خارج نموده و به کمک درب پلاستیکی ژل، پوشش آلومینیومی تیوب را سوراخ نمایید.



● سر تیوب ژل را به قسمت ۲ (مطابق شکل) با کمی فشار متصل کنید. یا یک دست اپلیکاتور را نگهداشته و با دست دیگر تیوب ژل را فشار دهید تا لوله اپلیکاتور پر از ژل شده و میله آن تا انتها به عقب برگردد.



● بهتر است به پشت خوابیده و اپلیکاتور سر از ژل را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو برده و سپس قسمت ۱ (مطابق شکل) را فشار داده تا ژل در عمق واژن تخلیه گردد.

● شرایط نگهداری:

● دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند.

● دارو را دور از دسترسی کودکان نگهداری کنید.

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳  
Ref: USP DI 2007

ساخت (پاریس دارو) تهران - ایران



Black



=



Pantone 273U