موپیروسین ۲٪
پماد موضعی

راهنمائیهای عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بـرای درمـان بیمـاری فعلی شمـا تجویـز شده است، لذا از مصـرف آن در موارد مشابـه و یا توصیـه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

۱ـ وجود هر نوع واکنش حساسیتی نسبت به این دارو یا هر پمادحاوی پـلی اتیلن گلیکول

۲ ـ بـارداری

۳ ـ نارسائیهـای شدید و متوسط کلیوی

مقدار و روش مصرف:

مقدار و روش مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند، ولی چنـانچه پزشک دستور خاصی نداده باشد مقدار مصرف معمولی این دارو بشکل زیر است:

بزرگسالان و کودکان:

مقدار کمی از پمـاد را ۲ تا ۳ بار در روز و حداکثر تا ۱۰ روز (برحسب نیاز) درمحل بمـالیـد.

محل را میتوان با گاز تمیز بست و یا باز گذاشت.

در پایان دوره درمـان چنانچـه بهبودی حاصل نشد به پزشک خود اطلاع دهید.

توجه:

موپیـروسین پمـاد چشمی یا داخل بینی نیست لـذا از مصرف آن در چشم و داخـل بینی جداً خودداری نمائید. در صورت مصرف در عفونت های پوست صورت دقت نمائید پماد به چشمها مالیده نشود.

عوارض جانبی:

اکثر داروهـا به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواستـه نیز بشونـد، موپیروسین نیـز ممکن است در محل مصرف باعث بـروز عوارض جـانبی خفیف مانند سـوزش، خـارش، سوزن سوزن شدن و غیـره شود که جای نـگرانـی نیست ولی در صورت مزاحمت به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

موپیروسین را دور از دسترس کودکان و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.

ساخت (پارس دارو)
تهران - ایران

صدای مشتری: ۷۴۳۷۳ ـ ۰۲۱
www.parsdarou.ir

موپیروسین ۲٪

پماد موضعی

راهنمائیهای عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بـرای درمـان بیمـاری فعلی شمـا تجویـز شده است، لذا از مصـرف آن در موارد مشابـه و یا توصیـه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

۱ـ وجود هر نوع واکنش حساسیتی نسبت به این دارو یا هر پمادحاوی پـلی اتیلن گلیکول

۲ ـ بـارداری

۳ ـ نارسائیهـای شدید و متوسط کلیوی

مقدار و روش مصرف:

مقدار و روش مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند، ولی چنـانچه پزشک دستور خاصی نداده باشد مقدار مصرف معمولی این دارو بشکل زیر است:

بزرگسالان و کودکان:

مقدار کمی از پمـاد را ۲ تا ۳ بار در روز و حداکثر تا ۱۰ روز (برحسب نیاز) درمحل بمـالیـد.

محل را میتوان با گاز تمیز بست و یا باز گذاشت.

در پایان دوره درمـان چنانچـه بهبودی حاصل نشد به پزشک خود اطلاع دهید.

توجه:

موپیـروسین پمـاد چشمی یا داخل بینی نیست لـذا از مصرف آن در چشم و داخـل بینی جداً خودداری نمائید. در صورت مصرف در عفونت های پوست صورت دقت نمائید پماد به چشمها مالیده نشود.

عوارض جانبی:

اکثر داروهـا به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواستـه نیز بشونـد، موپیروسین نیـز ممکن است در محل مصرف باعث بـروز عوارض جـانبی خفیف مانند سـوزش، خـارش، سوزن سوزن شدن و غیـره شود که جای نـگرانـی نیست ولی در صورت مزاحمت به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

موپیروسین را دور از دسترس کودکان و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.

ساخت (پارس دارو)
تهران - ایران

صدای مشتری: ۷۴۳۷۳ ـ ۰۲۱
www.parsdarou.ir

Pantone 278U