



تهران - ایران

ساخت «پارس دارو»

● دارو را دیر از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

● دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرایط نگهداری :

● زمان شیردهی توصیه نمی‌شود.

● شیردهی : در شیردهی مطالعه‌ای به منظور بررسی ترشح دارو در شیر مادر انجام نشده است و بنابراین مصرف آن در

زمینه وجود ندارد و بهتر است در چنین شرایطی از دارو استفاده نشود.

● حاملگی و شیردهی : پریکسابان® از نظر مصرف در بارداری در گروه C قرار دارد. این بدان معنا است که مطالعه‌کافی در این

مصرف در حاملگی و شیردهی:

دیلتامازم، اسید های چرب امگا ۳، ویتامین E

داروهایی که برای درمان ضربان غیر عادی قلب به کار میروند وراپامیل، آزیترومایسن ، کلاریترومایسین،

همزمان آنها با این دارو باعث کاهش اثر پریکسابان® می شود. (

داروهایی که برای درمان صرع هستند مانند فنی توئین، کاربامازپین، ریفامپین، فنوباریتال

کلویدیدوگرل، وارفارین و آسنوکومارول.

مصرف توأم پریکسابان® با سایر آنتی پلاکت ها، ریسک خونریزی را بیشتر می کند مانند انوکسپارین،

داروهای ضد ویروس برای HIV/AIDS مانند ریتوناویر، لوبیناویر، ایندیناویر.

مانند کتوکوناژول، اپتراکوناژول، وریکوناژول، ریتوناویر و ... اجتناب شود.

توصیه می‌شود از مصرف توأم پریکسابان® با داروهای ضد قارچ که مهارکننده های سیتوکروم P450 هستند،

سایر داروهای ضد انعقاد

مواد معدنی، داروهای گیاهی و ...) مشورت نمایند به خصوص در موارد زیر :

قبل از استفاده از این دارو با پزشک خود در مورد تمام نسخه ها و داروهایی که استفاده می‌کنید (حتی ویتامین ها،

تداخلات دارویی:

دستها و پاها .

قرمز رنگ، صورتی و یا قهوه‌ای است؛ مدفوع خونی یا قیری، سرفه خونی یا استفراغ ، درد عضلانی، خارش، درد در

که نیاز به هوشیاری دارد خودداری شود.

● این دارو ممکن است باعث گیجی و کاهش سطح هوشیاری شود لذا ضمن مصرف این دارو از رانندگی ویا کارهایی

● این دارو حای لاکتوز می‌باشد . در صورت بیماری عدم تحمل برخی قندها، با پزشک خود تماس یگیرید.

● در بیماران مبتلا به اختلال متوسط کلیوی با احتیاط مصرف شود.

● در بیماران مبتلا به اختلال متوسط تا شدید کبدی مصرف نشود.

● افزایش می‌یابد.

● از مصرف همزمان با مهارکننده‌های مستقیم ترومبین مثل Bivalirudin ، هپارین و مشتقات آن، انوکسپارین،

● مثلاً کلوییدوگرل با احتیاط مصرف شود.

● مثلاً کلویدوگرل با احتیاط مصرف شود.

● مثلاً کلویدوگرل با احتیاط مصرف شود.

پریکسابان®

ریواروکسaban

قرص روکش دار ۱۰، ۱۵، ۲۰ میلی‌گرم

قرص پریکسابان® بصورت قرصهای گرد روکش دار با سه دوز ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرمی است. هر قرص به ترتیب حاوی ۱۰، ۱۵

و ۲۰ میلی‌گرم ریواروکسaban است و بسته بندی آن به صورت ۳ پلیستر ۱۰ عددی است.

دسته دارویی:

پریکسابان® از دسته داروهای قلبی عروقی است.

موارد مصرف:

● پیشگیری از حوادث ترومبولیتیک بعد از جراحی‌های لگن و زانو

● پیشگیری از سکنه مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبرینولاسیون دهلیزی غیر درجه‌ای

● درمان لخته‌های خونی در وریدهای ساق (ترومبوز عمیق وریدی) و در عروق خونی ریه (انسداد جریان خون ریه)

مکانیسم اثر:

● باعث مهار فعالیت پلاکت و تشکیل لخته فیبرینی از طریق مهار مستقیم، انتخابی و برگشتپذیر فاکتور Xa (FXa) در

هر دو مسیر انعقادی داخلی و خارجی می‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

نحوه مصرف:

● مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می‌باشد.

● چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظر تان رسید، با پزشک یا داروساز خویش تماس یگیرید.

● در صورت تصمیم به قطع مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.

● قرص را هم زمان با غذا و ترجیحاً با آب میل نمایید.

● در صورت مصرف یک قرص ۲۰ میلی‌گرمی و یا یک قرص ۱۵ میلی‌گرمی یک بار در روز و فراموش نمودن یک نوبت از

مصرف دارو، به محض یاد آوری فوراً آن را میل نمایید. از مصرف بیشتر از یک قرص در روز به منظور جبران نوبت

فراموش شده خودداری نمایید.

● در صورت مصرف دو قرص ۱۵ میلی‌گرمی دو بار در روز و فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری

فوراً آن را میل نمایید. از مصرف بیشتر از دو قرص ۱۵ میلی‌گرمی در روز خودداری نمایید.

موارد منع مصرف :

● حساسیت شدید به دارو یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون

● خونریزی یا تاولوزیک فعال

● بیماری کبدی (Child-Pugh classes B and C) همراه با مشکلات انعقادی و خطر خونریزی، زخم ها یا شرایطی

که با خطر بروز خونریزی قابل توجه (به لحاظ بالینی) همراه است (سکنه مغزی همورازیک یا ایسکمیک، اختلال

اکتسابی یا خودبخودی هموستاز، زخم پپتیک فعال که اخیراً دچار خونریزی شده است).

درمان سیستمیک همزمان با داروهای مهارکننده CYP3A4 و P-گلیکوپروتئین (مانند کتوکونازول،

اپتراکوناژول، پوساکوناژول، ریتوناویر)؛

مصرف همزمان با سایر داروهایی که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کنند مثل هپارین (به جز هپارین لاک).

انوکسپارین، دالتپارین با مشتقات هپارین (مانند فونداپارینوکس)، مصرف همزمان با وارفارین، دایگاکران یا آپیکسابان

جز مواقعی که درمان از داروی ریواروکسaban به داروی دیگر و یا از داروی دیگر به داروی پریکسابان® تغییر می‌یابد؛

● بارداری، شیردهی

موارد هشدار و احتیاط:

● خونریزی‌های وسیع نظیر خونریزی داخل جمجمه، گوارشی، شبکیه، زیربوستی و آدرنال دیده شده است.

● در افراد مبتلا به بیماری و شرایطی که در معرض بروز خونریزی هستند: اندوکاردیت باکتریایی، خونریزی‌های ارثی یا

اکتسابی، ترومبوسیتوپنی، سوراخ شدن عروق بزرگ یا بیوسنی بافت‌ها، سکنه مغزی، جراحی مغزی یا سایر فرایندهای

نورونی، افزایش فشار خون شدید و کنترل نشده، خونریزی اخیر و وسیع، مصرف همزمان داروهای موثر بر هموستاز



قرص پریکسابان® بصورت قرصهای گرد روکش دار با سه دوز ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی است. هر قرص به ترتیب حاوی ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی گرم ریواروکسابان است و بسته بندی آن به صورت ۳ پلیستر ۱۰ عددی است.

دسته دارویی:

پریکسابان® از دسته داروهای قلبی عروقی است.

موارد مصرف:

- پیشگیری از حوادث ترومبولیتیک بعد از جراحی های لگن و زانو
- پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبرینولیتیک غیر درجه ای
- درمان لخته های خونی در وریدهای ساق (ترومبوز عمیق وریدی) و در عروق خونی ریه (انسداد جریان خون ریه)

مکانیسم اثر:

- باعث مهار فعالیت پلاکت و تشکیل لخته فیبرینی از طریق مهار مستقیم، انتخابی و برگشت پذیر فاکتور Xa (FXa) در هر دو مسیر انعقادی داخلی و خارجی می شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

نحوه مصرف:

- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.
- چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظر تان رسید، با پزشک یا داروساز خویش تماس بگیرید.
- در صورت تصمیم به قطع مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.
- قرص را هم زمان با غذا و ترجیحاً با آب میل نمایید.
- در صورت مصرف یک قرص ۲۰ میلی گرمی و یا یک قرص ۱۵ میلی گرمی یک بار در روز و فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری فوراً آن را میل نمایید. از مصرف بیشتر از یک قرص در روز به منظور جبران نوبت فراموش شده خودداری نمایید.
- در صورت مصرف دو قرص ۱۵ میلی گرمی دو بار در روز و فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری فوراً آن را میل نمایید. از مصرف بیشتر از دو قرص ۱۵ میلی گرمی در روز خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

- حساسیت شدید به دارو یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون
- خونریزی یا تاول زک فعال
- بیماری کبدی (Child-Pugh classes B and C) همراه با مشکلات انعقادی و خطر خونریزی، زخم ها یا شرایطی که با خطر بروز خونریزی قابل توجه (به لحاظ بالینی) همراه است (سکته مغزی همورازیک یا ایسکمیک، اختلال اکتسابی یا خود بخودی هموستاز، زخم پپتیک فعال که اخیراً دچار خونریزی شده است).
- درمان سیستمیک همزمان با داروهای مهارکننده CYP3A4 و P-گلیکوپروتئین (مانند کتوکونازول، اپتراکونازول، پوساکونازول، ریتوناویر)؛

مصرف همزمان با سایر داروهای که از لخته شدن خون جلوگیری می کنند مثل هپارین (به جز هپارین لاک)، انوکسابارین، دالتپارین یا مشتقات هپارین (مانند فونداپارینوکس)؛ مصرف همزمان با وارفارین، دایگاتران یا آپیکسابان جز مواقعی که درمان از داروی ریواروکسابان به داروی دیگر و یا از داروی دیگر به داروی پریکسابان® تغییر می یابد؛ بارداری، شیردهی

موارد هشدار و احتیاط:

- خونریزی های وسیع نظیر خونریزی داخل جمجمه، گوارشی، شبکیه، زیر پوستی و آدرنال دیده شده است.
- در افراد مبتلا به بیماری و شرایطی که در معرض بروز خونریزی هستند: اندوکاردیت باکتریایی، خونریزی های ارثی یا اکتسابی، ترومبوسیتوپنی، سوراخ شدن عروق بزرگ یا بیوسی بافتها، سکته مغزی، جراحی مغزی یا سایر فرایندهای نورونی، افزایش فشار خون شدید و کنترل نشده، خونریزی اخیر و وسیع، مصرف همزمان داروهای موثر بر هموستاز

- از مصرف همزمان با مهارکننده های مستقیم ترومبین مثل Bivalirudin، هپارین و مشتقات آن، انوکسابارین، آسپرین، مشتقات کومارین و سولفین پیرازون خودداری شود. NSAIDs و سایر مهارکننده های تجمع پلاستی مثل کلپیدوگرل با احتیاط مصرف شود.
- در افرادی که داروهای ضد انعقاد مصرف می کنند در صورت بی حسی اپی دورال یا نخاعی، ممکن است خونریزی و قلع موقتی ایجاد شود.
- در بیماران مبتلا به فیبرینولیتیک دهلیزی، خطر بروز سکته به دنبال قطع پریکسابان® افزایش می یابد.
- در بیماران مبتلا به اختلال متوسط تا شدید کبدی مصرف نشود.
- در بیماران مبتلا به اختلال متوسط کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- این دارو حاوی لاکتوز می باشد. در صورت بیماری عدم تحمل برخی قندها، با پزشک خود تماس بگیرید.
- این دارو ممکن است باعث گیجی و کاهش سطح هوشیاری شود لذا ضمن مصرف این دارو از رانندگی و یا کارهای که نیاز به هوشیاری دارد خودداری شود.
- پایش ادراری و ارزیابی بیمار برای کنترل مواردی مانند کاهش هموگلوبین و یا همتوکریت، شمارش پلاکتها و وجود خون در مدفوع انجام گردد.
- مصرف پریکسابان® باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از جراحی قطع گردد.

سمیت / عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. این عوارض عبارتند از: کبودی یا خونریزی (خونریزی بینی، خونریزی لثه، خونریزی قاعدگی سنگین)؛ درد، تورم، خونریزی از زخم یا تزریق سوزن، هر خونریزی که متوقف نخواهد شد. سردرد، سرگیجه، ضعف، احساس تهوع، ادراری که به نظر می رسد قرمز رنگ، صورتی و یا قهوه ای است؛ مدفوع خونی یا قیری، سرفه خونی یا استفراغ، درد عضلانی، خارش، درد در دستها و پاها.

تداخلات دارویی:

قبل از استفاده از این دارو با پزشک خود در مورد تمام نسخه ها و داروهای که استفاده می کنید (حتی ویتامین ها، مواد معدنی، داروهای گیاهی و ...) مشورت نمایید به خصوص در موارد زیر:

- سایر داروهای ضد انعقاد
- توصیه می شود از مصرف توأم پریکسابان® با داروهای ضد قارچ که مهارکننده های سیتوکروم P450 هستند، مانند کتوکونازول، اپتراکونازول، وریکونازول، ریتوناویر و ... اجتناب شود.
- داروهای ضد ویروس برای HIV/AIDS مانند ریتوناویر، لوبیناویر، ایندیناویر.
- مصرف توأم پریکسابان® با سایر آنتی پلاکت ها، ریسک خونریزی را بیشتر می کند مانند انوکسابارین، کلپیدوگرل، وارفارین و آسنتوکومارول.
- داروهای که برای درمان صرع هستند مانند فنی توئین، کاربامازپین، ریفامپین، فنوباریتال
- داروهای که در درمان افسردگی مصرف میشوند مانند ریفامپین، مشتقات استروژن، پروژستین ها (مصرف همزمان آنها با این دارو باعث کاهش اثر پریکسابان® می شود).
- داروهای که برای درمان ضرابان غیر عادی قلب به کار میروند مانند وراپامیل، آزیترومایسن، کلاریترومایسین، دیلتازم، اسید های چرب امگا ۳، ویتامین E

مصرف در حاملگی و شیردهی:

حاملگی: پریکسابان® از نظر مصرف در بارداری در گروه C قرار دارد. این بدان معنا است که مطالعه کافی در این زمینه وجود ندارد و بهتر است در چنین شرایطی از دارو استفاده نشود.

شیردهی: در شیردهی مطالعه ای به منظور بررسی ترشح دارو در شیر مادر انجام نشده است و بنابراین مصرف آن در زمان شیردهی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران

www.parsdarou.ir صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۴۳۷۲



=



Black



=



Pantone 526C

165mm

90mm

165mm

90mm