تربینافین ۱ درصد

کرم موضعی

دسته دارویی:

ضد قارچ

موارد مصرف:

عفونت قارچی بدن، عفونت قارچی کشاله ران، عفونت قارچی لای انگشتان پا یا کف پا.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

- دوره درمان را کامل کنید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

موارد منع مصرف:

وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو یا داروهای مشابه

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه **B**، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک انجام گیرد.

احتیاطات:

- در صورت بروز احتمالی حساسیت یا تحریکات پوستی مصرف دارو را قطع کرده و پزشک معالج را مطلع سازید.
- از مالیدن این دارو به اطراف یا داخل چشم، بینی، دهان و سایر بخش های مخاطی اجتناب نمایید.
- اگر بعد از یک هفته درمان با این دارو بهبود حاصل نشد به پزشک خود مراجعه کنید.
- بعد از حمام موضع را با دقت خشک نمایید.
- از قرار گرفتن در معرض گرما و رطوبت بیش از حد بپرهیزید.
- از لباس های کاملاً خشک، گشاد و نخی استفاده نمایید و هر روز آن را عوض کنید.
- بین دفعات درمان با این دارو، از پودرهای جاذب و ملایم روی پوست تحت درمان استفاده نمایید.
- مصرف این دارو در نوزادان و کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند ولی به طور معمول مقدار مصرف این دارو، به شرح زیر می باشد:

بهبود با این دارو به صورت تدریجی می باشد، در بسیاری از بیماران ممکن است تا ۲ الی ۶ هفته بعد از درمان کامل، بهبودی حاصل شود.

چنانچه پس از ۶ هفته بهبودی حاصل نشد، جهت تشخیص مجدد به پزشک خود مراجعه فرمایید.

بزرگسالان:

- عفونت قارچی بدن یا عفونت قارچی کشاله ران: یک یا دو بار در روز، به مدت ۱ تا ۴ هفته، روی پوست آسیب دیده و اطراف آن مالیده شود.
- عفونت قارچی لای انگشتان پا یا کف پا: دوبار در روز به مدت ۱ تا ۴ هفته، روی پوست آسیب دیده و اطراف آن مالیده شود.
- راش پوستی روی بالاتنه و انتهای اندام ها: یک یا دوبار در روز، به مدت ۲ هفته، روی پوست آسیب دیده و اطراف آن مالیده شود.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هریک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید.

خشکی، قرمزی، خارش، سوختگی، پوسته شدن، راش، سوزش یا هرگونه علایم تحریک پوستی که تا قبل از استفاده از این دارو مشاهده نشده است.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.

بسته بندی:

یک تیوب ۱۵ گرمی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی

صدای مشتری: ۳۷۳ ۷۴ ـ ۰۲۱

www.parsdarou.ir

ساخت شرکت پارس دارو

تهران | ایران

تربینافین ۱ درصد

کرم موضعی

دسته دارویی:

ضد قارچ

موارد مصرف:

عفونت قارچی بدن، عفونت قارچی کشاله ران، عفونت قارچی لای انگشتان پا یا کف پا.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

- دوره درمان را کامل کنید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

موارد منع مصرف:

وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو یا داروهای مشابه

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه **B**، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک انجام گیرد.

احتیاطات:

- در صورت بروز احتمالی حساسیت یا تحریکات پوستی مصرف دارو را قطع کرده و پزشک معالج را مطلع سازید.
- از مالیدن این دارو به اطراف یا داخل چشم، بینی، دهان و سایر بخش های مخاطی اجتناب نمایید.
- اگر بعد از یک هفته درمان با این دارو بهبود حاصل نشد به پزشک خود مراجعه کنید.
- بعد از حمام موضع را با دقت خشک نمایید.
- از قرار گرفتن در معرض گرما و رطوبت بیش از حد بپرهیزید.
- از لباس های کاملاً خشک، گشاد و نخی استفاده نمایید و هر روز آن را عوض کنید.
- بین دفعات درمان با این دارو، از پودرهای جاذب و ملایم روی پوست تحت درمان استفاده نمایید.
- مصرف این دارو در نوزادان و کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند ولی به طور معمول مقدار مصرف این دارو، به شرح زیر می باشد:

بهبود با این دارو به صورت تدریجی می باشد، در بسیاری از بیماران ممکن است تا ۲ الی ۶ هفته بعد از درمان کامل، بهبودی حاصل شود.

چنانچه پس از ۶ هفته بهبودی حاصل نشد، جهت تشخیص مجدد به پزشک خود مراجعه فرمایید.

بزرگسالان:

- عفونت قارچی بدن یا عفونت قارچی کشاله ران: یک یا دو بار در روز، به مدت ۱ تا ۴ هفته، روی پوست آسیب دیده و اطراف آن مالیده شود.
- عفونت قارچی لای انگشتان پا یا کف پا: دوبار در روز به مدت ۱ تا ۴ هفته، روی پوست آسیب دیده و اطراف آن مالیده شود.
- راش پوستی روی بالاتنه و انتهای اندام ها: یک یا دوبار در روز، به مدت ۲ هفته، روی پوست آسیب دیده و اطراف آن مالیده شود.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هریک از عوارض زیر بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید.

خشکی، قرمزی، خارش، سوختگی، پوسته شدن، راش، سوزش یا هرگونه علایم تحریک پوستی که تا قبل از استفاده از این دارو مشاهده نشده است.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.

بسته بندی:

یک تیوب ۱۵ گرمی به همراه برگه راهنما داخل جعبه مقوایی

صدای مشتری: ۳۷۳ ۷۴ ـ ۰۲۱

www.parsdarou.ir

ساخت شرکت پارس دارو

تهران | ایران

Black

Pantone 1545C