

تیکاپارس® ۹۰

تیکاگرلور

قرص روکش دار خط دار

قرص روکش دار خط دار تیکاگرلور با نام تجاری تیکاپارس® با دوز ۹۰ میلی گرم در جعبه ۳۰ عددی (۳ پلیستر ۱۰ عددی) عرضه می گردد.

موارد مصرف دارو:

- تیکاگرلور در بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری به صورت برگشت پذیر و غیر قابلتی به گیرنده آدنوزین دی فسفات P2Y12 در سطح پلاکت ها متصل شده و مانع فعالیت ADP (آدنوزین دی فسفات) می گردد و بدین ترتیب منجر به کاهش تجمع پلاکتی شده و از لخته شدن خون جلوگیری می کند. تیکاگرلور اغلب همراه با دوز پایینی از آسپرین تجویز می شود.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید.
- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.
- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک برسانید:
- استفاده از سایر داروها، ابتلا به بیماری های دیگر، در صورت بارداری و یا شیر دهی و وجود هرگونه حساسیت.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو یا هرگونه از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- در صورت اختلال شدید تا متوسط کبدی
- در صورت خونریزی پاتولوژیک فعال مانند زخم معده و خونریزی داخل جمجمه ای
- در صورت سابقه خونریزی داخل جمجمه ای
- مصرف همزمان داروهای مهارکننده قوی آنزیم CYP3A4.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی توصیه نمی شود. در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط تجویز شود.

هشدارها:

- بدون دستور پزشک از قطع مصرف دارو خودداری نمایید.
- اطلاعات کافی از ایمنی و اثربخشی این دارو در نوزادان، کودکان یا نوجوانان موجود نمی باشد.
- در صورت استفاده همزمان با داروی آسپرین، مقدار آسپرین نباید بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در روز باشد.

احتیاطات:

- در بیماران مبتلا به block AV درجه ۲ و ۳ (غیرطبیعی بودن ریتم قلب)، سندرم sinus sick (آریمی)، برادیکاردی (ضربان قلب پایین) ناشی از سنکوپ و دریافت کنندگان سایر داروهای با اثر برادیکاردیک با احتیاط مصرف شود.
- تیکاگرلور در آزمایشات عملکرد پلاکت، از جمله روش تجمع پلاکت ناشی از هپارین نتایج منفی کاذب ایجاد می کند.
- تیکاگرلور ریسک خونریزی را افزایش می دهد. در بیمارانی که عمل جراحی در پیش دارند باید حداقل ۵ روز قبل از جراحی دارو قطع شود.
- این دارو معمولاً به هنگام رانندگی و کار با ماشین آلات مشکلی ایجاد نمی کند. در صورت احساس گیجی و اختلال سطح هوشیاری، در هنگام رانندگی و کار با ماشین آلات احتیاط نمایید.

- بهتر است در بیمارانی که جراحی CABG (عمل جراحی بای پس سرخرگ کرونر) یا هر نوع جراحی دیگری داشتند شروع نشود.
- در حین مصرف تیکاگرلور ممکن است تنگی نفس ایجاد شود که نیاز به درمان خاصی ندارد، اما در صورت عدم تحمل، مصرف دارو زیر نظر پزشک قطع شود.
- در بیماران با سابقه هایپرآوریسمی (افزایش سطح اسید اوریک خون) یا آرتریت نقرسی با احتیاط مصرف شود.
- این دارو میتواند همراه با غذا یا بدون غذا مصرف شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:
- آسپرین، آپیکسایان، ریبواروکسایان، دایگاتران، دیسرویدین، سلکوکسیب، ایبوپروفن، دیگوسکین، لومیتاید، لووستاتین، سیمواستاتین، وارفارین، هپارین، پروسترون، مکمل های غذایی (دی هیدروآپی آندروسترون)
- مهارکننده های قوی CYP3A4 (مانند کتوکونازول، کلاریترومایسین، نفازودون، ریتوناویر و ...) و القا کننده های قوی CYP3A4 (کاربامازپین، دکزامتازون، فنوباریتال، فنی توفین، ریفامپین).

مقدار و نحوه مصرف دارو:

برای بیمارانی که قادر به بلع قرص نیستند می توان قرص ها را خرد کرده و با آب مخلوط نمود. سوسپانسیون تهیه شده را می توان به صورت خوراکی یا از طریق لوله بینی مصرف کرد. توصیه می شود در صورت مصرف خوراکی لیوان را مجدد از آب پر کرده، تکان داده و میل کنید و در صورتی که از طریق لوله بینی استفاده شد، پس از مصرف آن را با آب شستشو دهید.

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

دوز اولیه ۱۸۰ میلی گرم همراه با دوز اولیه ۳۲۵ میلی گرم آسپرین و سپس ۱۲ ساعت بعد از دوز اولیه، دوز نگهدارنده ۹۰ میلی گرم دو بار در روز همراه با ۷۵-۱۰۰ میلی گرم آسپرین یک بار در روز.

درمان با تیکاگرلور برای ۱۲ ماه ادامه می یابد. بعد از ۱۲ ماه دوز تیکاگرلور به ۶۰ میلی گرم دو بار در روز کاهش می یابد.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

عوارض شایع:

- برادی کاردی (ضربان قلب پایین)، فیبریلاسیون دهلیزی (دو حفره فوقانی قلب یعنی دهلیزهای قلب، فاقد ضربان مطلوب می باشند)، بلوک قلبی (غیرطبیعی بودن ریتم قلب، حساسیت (خارش، قرمزی پوست، کهیر)، اختلال انعقاد خون، تنگی نفس، خون ریزی، فشار خون، افت فشار خون، درد قفسه سینه، هایپراوریسمی (افزایش سطح اسید اوریک)، افزایش سرم کراتینین
- عوارض نادر:

- سردرد، سرفه، سرگیجه، حالت تهوع، اسهال، کمردرد، خستگی، سنکوپ
- در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- تا زمان مصرف، دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

ساخت «پارس دارو»

تهران - ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۲۷۳
www.parsdarou.ir

165mm