

تینیدازول

قرص روکش دار ۵۰۰ میلی گرمی

دسته دارویی:

ضد پروتوزوا

موارد مصرف:

- درمان آمیبیازیس روده ای و خارج روده ای (آبسه آمیبی کبد) ناشی از آنتامباهیستولیتیکا در کودکان بالای ۳ سال و در بزرگسالان
 - درمان ژiardیازیس (ناشی از ژiard یا دوئودونالیس) در کودکان بالای ۳ سال و در بزرگسالان
 - درمان تریکومونازیس (ناشی از تریکوموناس واژینالیس)، در آقایان و خانم ها
 - درمان عفونت های بی هوازی
 - درمان ژنژیویت اولسراتیو حاد
 - درمان واژینیت باکتریایی
 - درمان برای ریشه کن کردن هلیکوباکتر پیلوری (در زخم معده)
- راهنمایهای عمومی برای بیمار:**
- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
 - قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
 - دارا بودن هر گونه سابقه واکنش غیر عادی یا حساسیت به دارو و یا هر گونه مواد خوراکی، رنگی و نگهدارنده
 - عفونت های قارچی یا زخم های دهانی (احتمال بدتر شدن این مشکلات وجود دارد.)
 - برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را به همراه غذا مصرف نمایید.
 - از خوردن الکل یا سایر فرآورده های الکلی نظیر شربت های سرماخوردگی، الکزیرها و دهانشویه ها در حین درمان پرهیزید.
 - اگر علائم بیماری ظرف چند هفته بهبود نیافت به پزشک مراجعه کنید.
 - به علت احتمال ایجاد حالت خواب آلودگی توصیه می شود از رانندگی و کار با ابزاری که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیزید.
 - دوره درمان را کامل کنید و دارو را در فواصل زمانی معین مصرف نمایید.
 - در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
 - مصرف این دارو در افراد با نارسایی حاد کبدی با احتیاط صورت گیرد.
- موارد منع مصرف:**
- سه ماهه اول بارداری
 - بیمارانی که واکنش های افزایش حساسیت به این دارو و یا هر یک از مواد سازنده آن یا سایر نیتروایمیدازول ها دارند.
- مصرف در بارداری:**
- گروه C، تینیدازول از جفت عبور کرده و وارد گردش خون جنین می گردد، لذا مصرف آن در ۳ ماهه اول بارداری ممنوع است.
- مصرف در شیردهی:**
- از آنجایی که این دارو با غلظتی مشابه غلظت سرمی در شیر ترشح می گردد، لذا طی درمان و ۳ روز پس از قطع مصرف آن عدم شیردهی توصیه می گردد.

موارد احتیاط:

در بیماران با مشکلات CNS و بیماران با مشکل صرع، واکنش های نورولوژیک غیر طبیعی و حملات صرع گزارش شده است و باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.

تداخلات دارویی:

وارفارین، کلستیرامین، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، فنوباربیتال، فنی توفین، کتوکونازول، سایمتیدین، اکسی تتراسایکلین، لیتیم، فلورواوراسیل، دی سولفیرام

میزان مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است.

در بزرگسالان:

- درمان آمیبیازیس: ۲ گرم روزانه به مدت ۳ روز همراه با غذا
- درمان آبسه آمیبی کبد: ۲ گرم روزانه به مدت ۳ تا ۵ روز همراه با غذا
- درمان ژiardیازیس: ۲ گرم به صورت تک دوز همراه با غذا
- درمان تریکومونازیس: ۲ گرم به صورت تک دوز همراه با غذا
- درمان عفونت های باکتریایی بی هوازی: ۲ گرم برای دوز شروع، که با ۱ گرم روزانه یا ۵۰۰ میلی گرم دوبار در روز، به مدت ۵ الی ۶ روز دنبال می شود.
- پروفیلاکسی در جراحی های شکمی: ۲ گرم به صورت تک دوز حدود ۱۲ ساعت قبل از جراحی
- درمان ژنژیویت اولسراتیو حاد: ۲ گرم به صورت تک دوز
- درمان واژینیت باکتریایی: ۲ گرم به صورت تک دوز

در کودکان:

- درمان آمیبیازیس: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز (حداکثر تا ۲ گرم) به مدت ۳ روز همراه با غذا
- درمان آبسه آمیبی کبد: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز (حداکثر تا ۲ گرم) به مدت ۳ تا ۵ روز همراه با غذا
- درمان ژiardیازیس: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تک دوز (حداکثر تا ۲ گرم) همراه با غذا

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

برونکواسپاسم، تنگی نفس، کما، آنژیودما، نارسایی کبدی، کم خونی، نوتروپنی، لوکوپنی

شرایط نگهداری:

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

• دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



تینیدازول

قرص روکش دار ۵۰۰ میلی گرمی

دسته دارویی:

ضد پروتوزوا

موارد مصرف:

- درمان آمیبیازیس روده ای و خارج روده ای (آبسه آمیبی کبد) ناشی از آنتامباهیستولیتیکا در کودکان بالای ۳ سال و در بزرگسالان
- درمان ژیاودیازیس (ناشی از ژیاود یا دوئودونالیس) در کودکان بالای ۳ سال و در بزرگسالان
- درمان تریکومونازیس (ناشی از تریکوموناس واژینالیس)، در آقایان و خانم ها
- درمان عفونت های بی هوازی
- درمان ژنژیویت اولسراتیو حاد
- درمان واژینیت باکتریایی
- درمان برای ریشه کن کردن هلیکوباکتری پیلوری (در زخم معده)

راهنماییهای عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- دارا بودن هر گونه سابقه واکنش غیر عادی یا حساسیت به دارو و یا هر گونه مواد خوراکی، رنگی و نگهدارنده
- عفونت های قارچی یا زخم های دهانی (احتمال بدتر شدن این مشکلات وجود دارد.)
- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را به همراه غذا مصرف نمایید.
- از خوردن الکل یا سایر فرآورده های الکلی نظیر شربت های سرماخوردگی، الکزیرها و دهانشویه ها در حین درمان پرهیزید.
- اگر علائم بیماری ظرف چند هفته بهبود نیافت به پزشک مراجعه کنید.
- به علت احتمال ایجاد حالت خواب آلودگی توصیه می شود از رانندگی و کار با ابزاری که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیزید.
- دوره درمان را کامل کنید و دارو را در فواصل زمانی معین مصرف نمایید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- مصرف این دارو در افراد با نارسایی حاد کبدی با احتیاط صورت گیرد.

موارد منع مصرف:

- سه ماهه اول بارداری
- بیمارانی که واکنش های افزایش حساسیت به این دارو و یا هر یک از مواد سازنده آن یا سایر نیتروایمیدازول ها دارند.

مصرف در بارداری:

گروه C، تینیدازول از جفت عبور کرده و وارد گردش خون جنین می گردد، لذا مصرف آن در ۳ ماهه اول بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو با غلظتی مشابه غلظت سرمی در شیر ترشح می گردد، لذا طی درمان و ۳ روز پس از قطع مصرف آن عدم شیردهی توصیه می گردد.

موارد احتیاط:

در بیماران با مشکلات CNS و بیماران با مشکل صرع، واکنش های نورولوژیک غیر طبیعی و حملات صرع گزارش شده است و باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.

تداخلات دارویی:

وارفارین، کلستیرامین، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، فنوباربیتال، فنی توفین، کنتوکنازول، سایمتیدین، اکسی تتراسایکلین، لیتیم، فلورواوراسیل، دی سولفیرام

میزان مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است.

در بزرگسالان:

- درمان آمیبیازیس: ۲ گرم روزانه به مدت ۳ روز همراه با غذا
- درمان آبسه آمیبی کبد: ۲ گرم روزانه به مدت ۳ تا ۵ روز همراه با غذا
- درمان ژیاودیازیس: ۲ گرم به صورت تک دوز همراه با غذا
- درمان تریکومونازیس: ۲ گرم به صورت تک دوز همراه با غذا
- درمان عفونت های باکتریایی بی هوازی: ۲ گرم برای دوز شروع، که با ۱ گرم روزانه یا ۵۰۰ میلی گرم دوبار در روز، به مدت ۵ الی ۶ روز دنبال می شود.
- پروفیلاکسی در جراحی های شکمی: ۲ گرم به صورت تک دوز حدود ۱۲ ساعت قبل از جراحی
- درمان ژنژیویت اولسراتیو حاد: ۲ گرم به صورت تک دوز
- درمان واژینیت باکتریایی: ۲ گرم به صورت تک دوز

در کودکان:

- درمان آمیبیازیس: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز (حداکثر تا ۲ گرم) به مدت ۳ روز همراه با غذا
- درمان آبسه آمیبی کبد: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز (حداکثر تا ۲ گرم) به مدت ۳ تا ۵ روز همراه با غذا
- درمان ژیاودیازیس: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تک دوز (حداکثر تا ۲ گرم) همراه با غذا

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

برونکواسپاسم، تنگی نفس، کما، آنژیودما، نارسایی کبدی، کم خونی، نوتروپنی، لوکوپنی

شرایط نگهداری:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

