

تریپل سولفا (کرم و قرص واژینال)

مطالب لازم برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- این دارو فقط برای استعمال واژینال است.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- بلافاصله قبل و بعد از استعمال دارو دست ها را بشوئید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.

- دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی، کامل کنید.
- در صورتیکه پس از چند روز درمان بهبودی مشاهده نشد، به پزشک مراجعه کنید.
- برای درمان عفونت و پیشگیری از تشدید مجدد عفونت، اصول بهداشتی را رعایت کنید.
- برای جلوگیری از ایجاد و انتقال عفونت در هنگام مقاربت، مصرف کاندوم توصیه می شود.
- از تماس این دارو با چشم ها و غشاهای مخاطی مانند داخل بینی و دهان خودداری نمایید، در صورت تماس با چشم ها، آنها را با جریان آب سریع بشوئید.

راهنمایی عمومی برای مصرف صحیح دارو:

لازم است قبل از مصرف این دارو، چنانچه بیمار، دارای هر یک از شرایط زیر می باشد، پزشک خویش را مطلع سازد:

- سابقه حساسیت نسبت به این دارو، داروهای مشابه یا هر ماده دیگر اعم از دارویی، غذایی، مواد محافظ و رنگ ها.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر.
- وجود بیماریهایی از قبیل فاویسم، بیماری کلیوی و پورفیری

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود :

مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو را پزشک برحسب شرایط بیمار تعیین می نماید. در صورتیکه توصیه خاصی نشده باشد، مقدار مصرف معمولی دارو به شرح زیر است:

- کرم
یک اپلیکاتور پر از کرم روزانه ۲ بار به مدت ۶ - ۴ روز (در صورت نیاز درمان با مصرف اپلیکاتور ۲ بار در روز ادامه خواهد یافت).

قرص

یک قرص روزانه ۲ بار به مدت ۱۰ روز .

راهنمای مصرف :

- قرص واژینال :


- ۱ - قرص را با قیچی از نوار آلومینیومی بیرون بیاورید.
- ۲ - میله داخل اپلیکاتور را تا انتها به عقب بکشید و قرص را داخل دهانه آن قرار دهید.
- ۳ - اپلیکاتور همراه با قرص را در داخل واژن تا آنجا که ممکن است عمیقتر فرو برید (بهتر است به پشت بخوابید).

۴ - میله اپلیکاتور را فشار دهید وقتی از حرکت ایستاده قرص داخل واژن قرار گرفته است. سپس اپلیکاتور را خارج نمایید.

۵ - بعد از هر بار مصرف دو قطعه اپلیکاتور را از هم جدا کرده، سپس آنها را با آب ولرم و صابون شسته و خشک نمایید و دو قطعه را برای مصرف بعدی روی هم سوار کنید.

کرم واژینال :

- تیوب کرم را از جعبه خارج نموده و به کمک درب پلاستیکی کرم، پوشش آلومینیومی تیوب را سوراخ نمایید.



سر تیوب کرم را به قسمت ۲ (مطابق شکل) با کمی فشار متصل کنید. با یک دست اپلیکاتور را نگهداشته و با دست دیگر تیوب کرم را فشار دهید تا لوله اپلیکاتور پر از کرم شده و میله آن تا انتها به عقب برگردد.



- بهتر است به پشت خوابیده و اپلیکاتور پر از کرم را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو برده و سپس قسمت ۱ (مطابق شکل) را فشار داده تا کرم در عمق واژن تخلیه گردد.
- پس از هر بار مصرف، دو قطعه را از هم جدا کرده و آنها را با آب ولرم و صابون شسته، خشک کنید و دو قطعه جدا شده را برای مصرف بعدی روی هم سوار کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند :

حساسیت مفرط، خارش، سوزش، بثورات جلدی، قرمزی، تورم یا سایر علائم تحریک پوست که قبل از درمان وجود نداشته اند.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی :

قرص : هر جعبه حاوی ۵ استریپ ۴ تایی قرص واژینال تریپل سولفا به همراه یک عدد اپلیکاتور می باشد.
کرم : هر جعبه حاوی یک تیوب ۷۸ گرمی کرم واژینال تریپل سولفا به همراه یک عدد اپلیکاتور می باشد.

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۴۷۳
www.parsdarou.ir
Reference: Drugs.com

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران



تریپل سولفا (کرم و قرص واژینال)

مطالب لازم برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- این دارو فقط برای استعمال واژینال است.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف نمایید. از مقدار پر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- بلافاصله قبل و بعد از استعمال دارو دست ها را بشوئید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یاد آوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.
- دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی، کامل کنید.
- در صورتیکه پس از چند روز درمان بهبودی مشاهده نشد، به پزشک مراجعه کنید.
- برای درمان عفونت و پیشگیری از تشدید مجدد عفونت، اصول بهداشتی را رعایت کنید.
- برای جلوگیری از ایجاد و انتقال عفونت در هنگام مقاربت، مصرف کاندوم توصیه می شود.
- از تماس این دارو با چشم ها و غشاهای مخاطی مانند داخل بینی و دهان خودداری نمایید، در صورت تماس با چشم ها، آنها را با جریان آب سریع بشوئید.

راهنمایی عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- لازم است قبل از مصرف این دارو، چنانچه بیمار، دارای هر یک از شرایط زیر می باشد، پزشک خویش را مطلع سازد:
- سابقه حساسیت نسبت به این دارو، داروهای مشابه یا هر ماده دیگر اعم از دارویی، غذایی، مواد محافظ و رنگ ها.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر.
- وجود بیماریهایی از قبیل فایسیم، بیماری کلیوی و پورفیری

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود :

مقدار مصرف دارو :

- مقدار مصرف دارو را پزشک برحسب شرایط بیمار تعیین می نماید. در صورتیکه توصیه خاصی نشده باشد، مقدار مصرف معمولی دارو به شرح زیر است:
- کرم
- یک اپلیکاتور پر از کرم روزانه ۲ بار به مدت ۶ - ۴ روز (در صورت نیاز درمان با مصرف اپلیکاتور ۲ بار در روز ادامه خواهد یافت).
- قرص
- یک قرص روزانه ۲ بار به مدت ۱۰ روز.

راهنمای مصرف :


- قرص واژینال :
- ۱ - قرص را با قیچی از نوار آلومینیومی بیرون بیاورید.
- ۲ - میله داخل اپلیکاتور را تا انتها به عقب بکشید و قرص را داخل دهانه آن قرار دهید.
- ۳ - اپلیکاتور همراه با قرص را در داخل واژن تا آنجا که ممکن است عمیقتر فرو برید (بهتر است به پشت بخوابید).

۴ - میله اپلیکاتور را فشار دهید وقتی از حرکت ایستاده قرص داخل واژن قرار گرفته است. سپس اپلیکاتور را خارج نمایید.

۵ - بعد از هر بار مصرف دو قطعه اپلیکاتور را از هم جدا کرده، سپس آنها را با آب ولرم و صابون شسته و خشک نمایید و دو قطعه را برای مصرف بعدی روی هم سوار کنید.

کرم واژینال :

• تیوب کرم را از جعبه خارج نموده و به کمک درب پلاستیکی کرم، پوشش آلومینیومی تیوب را سوراخ نمایید.



سر تیوب کرم را به قسمت ۲ (مطابق شکل) با کمی فشار متصل کنید. با یک دست اپلیکاتور را نگهداشته و با دست دیگر تیوب کرم را فشار دهید تا لوله اپلیکاتور پر از کرم شده و میله آن تا انتها به عقب برگردد.



- بهتر است به پشت خوابیده و اپلیکاتور پر از کرم را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو برده و سپس قسمت ۱ (مطابق شکل) را فشار داده تا کرم در عمق واژن تخلیه گردد.
- پس از هر بار مصرف، دو قطعه را از هم جدا کرده و آنها را با آب ولرم و صابون شسته، خشک کنید و دو قطعه جدا شده را برای مصرف بعدی روی هم سوار کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند :

حساسیت مفرط، خارش، سوزش، بثورات جلدی، قرمزی، تورم یا سایر علائم تحریک پوست که قبل از درمان وجود نداشته اند.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی :

قرص : هر جعبه حاوی ۵ استریپ ۴ تایی قرص واژینال تریپل سولفا به همراه یک عدد اپلیکاتور می باشد.

کرم : هر جعبه حاوی یک تیوب ۷۸ گرمی کرم واژینال تریپل سولفا به همراه یک عدد اپلیکاتور می باشد.

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۴۷۳
www.parsdarou.ir
Reference: Drugs.com

ساخت «پارس دارو»
تهران - ایران



=



Black



=



186U

PANTONE