

تداخلات دارویی:

- مصرف اورلیستات مانع از جذب ویتامین ای می شود.
- مصرف همزمان با کلاستیرامین، کلاستیپول، ایزونیاژید، روغن پارافین و سوکرافیت باعث کاهش جذب ویتامین ای خواهد شد.
- مصرف همزمان همراه با فنوباریتال، فنیتوئین و کاربامازپین باعث کاهش سطح ویتامین ای در پلاسما می شود.
- ممکن است مصرف همزمان ویتامین ای همراه با داروهای ضد پلاکت خون مانند آسپرین، دی پیریدامول، اپتی فیباتاید، کلوییدوگرل، تیکلوپیدین هیدروکلراید، تیروفیبان، ابسیکسیماب و داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین خطر خونریزی را افزایش دهد.
- فیبرهای رژیمی باعث کاهش اثر آنتی اکسیدانی ویتامین ای می شود.
- مصرف همزمان ویتامین ای با آهن خطر اکسیداسیون ویتامین ای را افزایش میدهد

مقدار و نحوه مصرف:

- روزانه یک عدد همراه با غذا میل شود.
- در دوران بارداری با تجویز پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی:

- در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.
- خستگی، درد قفسه سینه، دردهای شکمی، اختلالات عاطفی، ترومبولیت (فرآیند التهابی است که باعث ایجاد لخته شدن خون می شود)، اختلالات گوارشی، تغییر سطح چربی خون، مشکلات تیروئیدی، اسهال، خونریزی.
- در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دور از نور و رطوبت، در جای خشک و خنک نگهداری نماید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.



صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۳۳۳۳۳۳
www.parsdarou.ir

ویتامین ای ۴۰۰ (به صورت آلفا-توکوفرل استات) کپسول ژلاتینی نرم

ویتامین ای به صورت کپسول ژلاتینی نرم زرد رنگ با دوز ۴۰۰ واحد بین المللی در بسته بندی ۵۰ عددی عرضه می شود.

موارد مصرف:

ویتامین ای دارای اثرات زیر می باشد:

کمک به تأمین ویتامین ای مورد نیاز بدن

آنتی اکسیدان

ویتامین ای یکی از ویتامین های محلول در چربی است و مهم ترین مزیت آن کمک به کاهش علائم کمبود ویتامین ای در بدن و اثرات آنتی اکسیدانی جهت جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد می باشد. ویتامین ای در لایه چربی غشاهای سلول قرار می گیرد با محافظت بافت چربی در مولکول های LDL از اکسیداسیون و تخریب چربی ها جلوگیری کرده و همچنین از غشاهای سلولی محافظت می نماید.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی باشد.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای دیگر این مکمل
- در دوران بارداری و شیردهی نباید بیشتر از مقدار مجاز تعریف شده (RDA) مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

ویتامین ای به مقدار ناچیز از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی با صلاحدید پزشک مجاز می باشد.

احتیاطات:

- ویتامین ای همزمان با داروی وارفارین باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در افرادی که دچار کمبود ویتامین کا و نارسایی های کبدی هستند باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در افرادی که دچار بیماری ارثی هموفیلی هستند باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در افرادی که سابقه سکنه مغزی دارند باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در صورت وجود سابقه بیماری های انعقادی، با احتیاط مصرف شود.
- کپسول را بلعید و از جویدن آن بپرهیزید.
- دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تداخلات دارویی:

- مصرف اورلیستات مانع از جذب ویتامین ای می شود.
- مصرف همزمان با کلستیرامین، کلستیپول، ایزونیاژید، روغن پارافین و سوکرافیت باعث کاهش جذب ویتامین ای خواهد شد.
- مصرف همزمان همراه با فنوباریتال، فنتیوین و کاربامازپین باعث کاهش سطح ویتامین ای در پلاسما می شود.
- ممکن است مصرف همزمان ویتامین ای همراه با داروهای ضد پلاکت خون مانند آسپرین، دی پیریدامول، اپتی فیبتاید، کلوییدوگرل، تیکلوپیدین هیدروکلراید، تیروفیبان، اسیکسیماب و داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین خطر خونریزی را افزایش دهد.
- فیبرهای رژیمی باعث کاهش اثر آنتی اکسیدانی ویتامین ای می شود.
- مصرف همزمان ویتامین ای با آهن خطر اکسیداسیون ویتامین ای را افزایش میدهد

مقدار و نحوه مصرف:

روزانه یک عدد همراه با غذا میل شود.
در دوران بارداری با تجویز پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی:

در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.
خستگی، درد قفسه سینه، دردهای شکمی، اختلالات عاطفی، ترومبولیت (فرآیند التهابی است که باعث ایجاد لخته شدن خون می شود)، اختلالات گوارشی، تغییر سطح چربی خون، مشکلات تیروئیدی، اسهال، خونریزی.
در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دور از نور و رطوبت، در جای خشک و خنک نگهداری نماید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.

ویتامین ای ۴۰۰ (به صورت آلفا-توکوفرل استات) کپسول ژلاتینی نرم

ویتامین ای به صورت کپسول ژلاتینی نرم زرد رنگ با دوز ۴۰۰ واحد بین المللی در بسته بندی ۵۰ عددی عرضه می شود.

موارد مصرف:

ویتامین ای دارای اثرات زیر می باشد:
کمک به تأمین ویتامین ای مورد نیاز بدن
آنتی اکسیدان

ویتامین ای یکی از ویتامین های محلول در چربی است و مهم ترین مزیت آن کمک به کاهش علائم کمبود ویتامین ای در بدن و اثرات آنتی اکسیدانی جهت جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد می باشد. ویتامین ای در لایه چربی غشاهای سلول قرار می گیرد با محافظت بافت چربی در مولکول های LDL از اکسیداسیون و تخریب چربی ها جلوگیری کرده و همچنین از غشاهای سلولی محافظت می نماید.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی باشد.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای دیگر این مکمل
- در دوران بارداری و شیردهی نباید بیشتر از مقدار مجاز تعریف شده (RDA) مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

ویتامین ای به مقدار ناچیز از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی با صلاحدید پزشک مجاز می باشد.

احتیاطات:

- ویتامین ای همزمان با داروی وارفارین باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در افرادی که دچار کمبود ویتامین کا و نارسایی های کبدی هستند باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در افرادی که دچار بیماری ارثی هموفیلی هستند باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در افرادی که سابقه سکنه مغزی دارند باید با احتیاط مصرف شود.
- ویتامین ای در صورت وجود سابقه بیماری های انعقادی، با احتیاط مصرف شود.
- کپسول را بلعید و از جویدن آن بپرهیزید.
- دور از دسترس کودکان قرار دهید.



=



Black



=



Pantone
7548C

