

زینک + ویتامین ث (۱۰ + ۳۰۰ میلی گرم) کپسول ژلاتینی نرم

زینک + ویتامین ث به صورت کپسول ژلاتینی نرم حاوی زینک گلوکونات ۷۰ میلی گرم (معادل ۱۰ میلی گرم عنصر زینک) و ویتامین ث ۳۰۰ میلی گرم در بسته بندی ۶۰ عددی عرضه می شود.

موارد مصرف :

-کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
-کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن
این محصول حاوی آنتی اکسیدان آسکوربیک اسید (ویتامین ث) و ماده معدنی زینک است که به عنوان مکمل برای تامین کمبود ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن که تنها از طریق مصرف موادغذایی جبران نمی شود، استفاده می شود.
ویتامین ث و زینک نقش مهمی در تامین تغذیه مناسب و تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا می کنند.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

• این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی باشد.

موارد منع مصرف :

• در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از اجزای این فرآورده

• در صورت مصرف بیش از یک محصول مولتی ویتامین، از مصرف این فرآورده به طور

همزمان خودداری نمایید

• این فرآورده را با شیر، سایر محصولات لبنی، مکمل های کلسیم یا آنتی اسیدهای

حاوی کلسیم مصرف نکنید.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

• در دوران بارداری و شیر دهی با تجویز پزشک مصرف شود.

احتیاطات :

• در صورت ابتلا به آنمی و نقص G6PD و نارسایی حاد کلیه قبل از مصرف این فرآورده با

پزشک خود مشورت نمایید.

• کپسول ژلاتینی نرم را ببلعید و از جویدن آن پرهیزید .

• دور از دسترس کودکان قرار دهید.

• از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

• مصرف همزمان فرآورده های حاوی زینک با آنتی بیوتیک های کینولونی باعث افزایش جذب هر دوی آنها می شود.

• مصرف همزمان فرآورده های حاوی زینک با تتراسایکلین ها باعث کاهش جذب هر دوی آنها می شود.

• مصرف همزمان فرآورده های حاوی زینک با پنسیلیمین و کلسیم باعث کاهش جذب زینک می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

• بزرگسالان: روزانه یک عدد کپسول ژلاتینی نرم همراه غذا و با آب میل شود.

عوارض جانبی:

در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

• ناراحتی معده، سردرد، احساس طعم غیر معمول یا ناخوشایند در دهان، کپسیر، مشکل در تنفس، تهوع، استفراغ، تحریک زبان، خشکی دهان، اسهال و تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو.

• مواد معدنی (به ویژه دوزهای زیاد) می تواند عوارضی مانند تغییر رنگ دندان، افزایش ادرار، خونریزی معده، ضربه قلب نامنظم، گیجی و ضعف عضلانی یا احساس لنگیدن ایجاد کنند.

• در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

شرایط نگهداری :

• دور از نور و رطوبت، در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳
www.parsdarou.ir

صاحب پروانه شرکت پارس دارو
ساخت ایران

