

• این دارو باید برای درمان بیمارانی که شواهدی از آتروفی پوست دارند، برای دوره های کوتاه مدت و تحت نظارت دقیق پزشکی استفاده شود.

احتیاطات :

- این دارو در بیماران دیابتی با احتیاط استفاده شود. ممکن است جذب سیستمیک کورتیکواستروئید موضعی، باعث تشدید دیابت شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از داروی متیراپون حتماً پزشک خود را مطلع سازید. داروهای کورتیکواستروئیدی، باید قبل و در حین استفاده از داروی متیراپون قطع شوند.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است: بزرگسالان : یک لایه نازک از پماد دزوناید ۱ تا ۴ بار در روز بر اساس شدت ضایعه بر روی موضع استعمال گردد.
- سالمندان: یک لایه نازک از پماد دزوناید ۱ بار در روز بر روی موضع استعمال گردد.

عوارض جانبی دارو:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خویش مشورت نمایید.

• عوارض شایع:

آتروفی پوست، فولیکولیت، فوران های آکنه، عفونت پوستی، درماتیت، اختلال بینایی.

• عوارض نادر:

- سوزش، خارش و خشکی پوست.
- در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری :

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از یخ زدگی محافظت نمایید.



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴ ۳۷۳
www.parsdarou.ir

دزو کوئل® ۰/۰۵ درصد

دزوناید پماد موضعی

دزوناید با نام تجاری دزو کوئل® به صورت پماد موضعی ۰/۰۵ درصد در بسته بندی ۱۵ گرمی در جعبه یک عددی همراه با بروشور به بازار عرضه می شود.

موارد مصرف :

- پماد موضعی دزوناید ۰/۰۵ درصد یک کورتیکواستروئید با قدرت خفیف تا متوسط بوده که به منظور تسکین التهاب و خارش ناشی از بیماری های پوستی مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار :

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
- دوره درمان را مطابق با نظر پزشک کامل کنید.
- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز میباشد.
- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک برسانید:
- در صورت بارداری یا شیردهی و جهت استفاده برای کودکان و افراد سالمند

موارد منع مصرف :

- وجود هر گونه حساسیت به کورتیکواستروئید های موضعی و هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو.
- این دارو نباید برای درمان درماتیت اطراف دهان ، آکنه ولگاریس یا آکنه روزاسه استفاده شود زیرا ممکن است این شرایط را تشدید کند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی در صورت نیاز قطعی باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط تجویز شود.

هشدارها

- از تماس دارو با چشم ها و اطراف آن خودداری نمایید. در صورت برخورد با چشم، آن را با آب به خوبی شستشو دهید.
- در صورت عدم بهبودی علامت بعد از یک هفته، با پزشک خود مشورت نمایید.
- از پوشاندن پوشک تنگ یا شلوار پلاستیکی برای کودکانی که در ناحیه پوشک تحت معالجه قرار می گیرند، خودداری شود، زیرا این لباس ها می توانند به عنوان یک پانسمان انسداد عمل کرده و جذب سیستمیک دارو را افزایش دهند.